This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

FE 44 58

Digitized by Google

3 2044 106 454 093

FL
44
L28

Digitized by Google

CATALOGUE

DES PLANTES

LES PLUS INTÉRESSANTES

CROISSANT DANS LA

PARTIE SUPÉRIEURE DES HAUTES-ALPES

(Briançonnais, le Queyras et le haut du vallon de Vars)

Altitude minimum 1,100 mètres et maximum 3,000 mètres.

Par M. LANNES
Capitaine des Douanes en retraite
à Briançon

Extrait du *Bulletin de la Société d'Etudes des Hautes-Alpes* de 1885, nos 14 et 15

GAP
IMPRIMERIE JOUGLARD PÈRE ET FILS

1885

Digitized by Google

July 1999
2 of 5-2.

Digitized by Google

CATALOGUE DES PLANTES

LES PLUS INTÉRESSANTES

CROISSANT DANS LA

PARTIE SUPÉRIEURE DU DÉPARTEMENT DES HAUTES-ALPES

(*Briançonnais, le Queyras et le haut du vallon de Vars*)

Altitude minimum 1100 mètres et maximum 3000 mètres.

Le travail botanique que je présente à la *Société d'Études*, peut, pour certains membres, n'avoir aucun intérêt. Je ne me fais pas d'illusions à ce sujet. Cependant je crois qu'il pourra être agréable à plusieurs et surtout utile aux Professeurs, Instituteurs et Institutrices du Briançonnais qui, ayant le goût des herborisations, reçoivent le bulletin de la Société. Avec les indications que je donne, ils ne manqueront pas de faire avec leurs élèves des excursions assurées, c'est-à-dire de se procurer, dans les endroits indiqués, les espèces que je signale.

Mon essai est encore bien incomplet, mais il commence une nomenclature que je pense augmenter avec le temps. D'ailleurs je crois pouvoir espérer que mon exemple étant suivi par d'autres, il devra sortir de ce mouvement des travaux partiels qui, avec le temps, feront un tout complet, c'est ce que je désire et, cela étant, je serais on ne peut plus heureux et payé de mon initiative.

Digitized by Google

C'est la classification naturelle employée dans la plupart des meilleures Flores que j'ai suivie. Aussi avec les ouvrages de MUTEL, de GRENIER et GODRON, de CARIOT, etc., on pourra facilement utiliser mes renseignements et retrouver presque tous les noms que j'ai adoptés.

Une classification alphabétique ne m'a pas paru convenable : elle sépare trop les genres.

J'aurais pu, me dira-t-on, mettre à côté du nom latin, le nom français. La chose n'eût pas été fort pratique et eût été très longue, car les noms français sont très différents dans les diverses provinces et même d'une vallée à l'autre.

Une indication assez utile est celle des altitudes où croît chaque espèce de plantes. Celle de l'époque de la floraison, pour certaines familles, et de la fructification, pour d'autres dont les fruits sont caractéristiques, a été indiquée par des chiffres. Ainsi 3 signifie mars ; 4, avril ; 5, mai ; 6, juin, et ainsi de suite.

Briançon, 21 janvier 1885.

LANNES,

Capitaine des douanes en retraite.

Digitized by Google

CATALOGUE

Renonculacées.

Atragene alpina L. Lieux rocailleux, bois: Arcines, Lautaret à Pra-Brunet, Névache, Monêtier, Briançon, Villard-Saint-Pancrace, Cervières, bois Foran en Queyras, etc. Alt. 1300-2000 m. Fl. 5-6.

Thalictrum aquilegifolium L. Côteaux et prairies boisées : Arcines, Lautaret, Saint-Véran à la Grangeasse, col de Vars, etc. 1900-2100 m. Fl. 6.

— *alpinum* L. Lieux tourbeux : col de Vars en face du refuge. 2000 m. Fl. 6-7.

— *fœtidum* L. Lieux rocailleux : vallon d'Arcines près le Casset, Monêtier, Briançon sous le fort des Trois-Têtes. 1350-1700 m. Fl. 5-7.

— *odoratum* GG. Lieux pierreux: Lautaret. 2000 m. Fl. 7.

— *monticolum Jord.* Prairies : Lautaret. 2000 m. Fl. 7.

— *præcox Jord.* Côteaux : Briançon sous le fort des Trois-Têtes. 1300 m. Fl. 6.

— *alpicolum Jord.* Prairies du Lautaret au col Arcines, 2000 m. Fl. 7.

Anemone vernalis Lill. Pâturages maigres : Lautaret, Névache, Montgenèvre à Gondran, col Isoard, les Ayes, Saint-Véran à Sérennes, col de Vars, etc. 1800-2200 m. Fl. 5-6.

— *Halleri All.* Pâturages rocailleux : Notre-Dame de Prorel, près Briançon. 1700. Fl. 6.

— *montana Hoppe.* Côteaux, rochers : sous le fort des Trois-Têtes à Briançon, Villard-Saint-Pancrace. 1300 m. Fl. 6.

— *alpina Lois.* Côteaux escarpés : Briançon, Montgenèvre, Granon près Val-des-Prés, Cervières, Saint-Véran, etc. 1300-2000 m. Fl. 5-6.

— *sulfurea* L. Prairies : Lautaret, Montgenèvre à Gondran, Saint-Véran à côte Grimaud, col de Vars, etc. 1900-2200 m. Fl. 6.

— *myrrhidifolia Vill.* Prairies : Lautaret, Montgenèvre, Saint-Véran, col de Vars. 1900-2200 m. Fl. 6.

Digitized by Google

Anemone Baldensis L. Débris de roches; Arcines, Lautaret, Galibier, col des Thures sur Névache, cols Isoard et des Ayes, Saint-Véran, etc. 2000-2200 m. Fl. 6-7.

— *narcissiflora* L. Prairies : Arcines, Lautaret, Saint-Véran à Roche-ronde, col de Vars, etc. 2000-2300 m. Fl. 5-7.

Hepatica triloba Chaix. Lisière des bois : Monêtier, Névache, Lavachette, etc. 1500-1600 m. Fl. 4.

Callianthemum rutæfolium C. A. M. Prairies : Galibier, Saint-Véran sous la chapelle de Clausis et entre le torrent et le bois de la Selle. 2300 m. Fl. 6-7.

Ceratocephalus falcatus Mœnch. Côteaux : de Briançon au pont coupé. 1300 m. Fl. 3-4.

Ranunculus alpestris L. Pâturages rocailleux: Mont-Viso à la Taillante, vallon Agnel. 2300 m. Fl. 6-7.

— *glacialis* L. Lieux rocailleux humides : Galibier, Cervières à Terre-nière et à Venton, col des Ayes, Mont-Viso à Ruines et à la Traversette, Saint-Véran, etc. 2500 m. Fl; 7-8.

— *aconitifolius* L. Lieux humides : Lauzet en face des Boussardes, Névache, Montgenèvre. 16-1900 m. Fl. 5-6.

— *platanifolius* L. Lieux secs et broussailleux : Val-des-prés à la Casse, Montgenèvre à Gondran. 1400-2200 m. Fl. 6-7.

— *parnassifolius* L. Débris pierreux : Galibier, crête de Paneyroun à gauche du col de Vars. 2600 m. Fl. 7-8.

— *pyrenæus* L. Pâturages : Arcines, Lautaret, Montgenèvre, Saint-Véran, col de Vars, etc. 1800-2200 m. Fl. 4-6.

— *auricomus* L. Prairies, bois : Monêtier-de-Briançon et Casset. 15-1600 m. Fl. 5.

— *montanus Willd.* Pelouses : Montgenèvre, Saint-Véran, col de Vars, etc. 2000 m. Fl. 5-7.

— *gracilis Schl.* Pelouses : Montgenèvre. col de Vars, etc. 1900-2100 m. Fl. 5-6.

Digitized by Google

Ranunculus Villarsii DC. Bois : Arcines, Lautaret à Pra-Brunet, Montgenèvre, Saint-Véran à côte Grimaud, etc. 19-2200 m. Fl. 6.

— *aduncus* GG. Bois : Monêtier, Montgenèvre, Cervières, Saint-Véran, vallon de Vars, etc. 1500-2000 m. Fl. 5-6.

— *lanuginosus* L. Bois : Briançon. 1400 m. Fl. 6.

— *arvensis* L. (à fruits inermes). Moissons : Briançon, 1300 m. Fl. 6.

Caltha palustris L. Bords des ruisseaux : partout, depuis Briançon jusqu'aux hautes prairies marécageuses. Fl. 4-7.

Trollius europæus L. Prairies : Lautaret, Monêtier, Val-des-prés, Montgenèvre, Saint-Véran, col de Vars, etc., etc. 1400-2200 m. Fl. 5-8.

Aquilegia alpina L. Prairies-bois : Lautaret, de Montgenèvre à Gondran, Saint-Véran; etc. 2000 m. Fl. 7.

Delphinium consolida L. Champs après la moisson : Lavachette, les Alberts, etc. 1400 m. Fl. 7.

— *montanum DC.* Prairies pierreuses : du Lautaret au Galibier, Montgenèvre dans les Sauréots et à Gondran, Saint-Véran aux Chalanches, etc. 2200 m. Fl. 7-8.

Aconitum lycoctonum L. Côteaux : Lautaret, la Madeleine, Saint-Véran, etc. 1800-2200 m. Fl. 7-8.

— *anthora* L. Pâturages rocailleux : Alp du Villard d'arènes, Lautaret, Mont-Viso, etc. 2000 m. Fl. 8.

— *paniculatum Lam.* Bois : Lautaret au bois de la Madeleine. 1900 m. Fl. 7.

Actæa spicata L. Bois : Monêtier, Val-des-prés à la Casse, 14-1500 m. Fl. 6.

Berbéridées.

Berberis vulgaris L. Haies et côteaux : commun autour de Briançon. 1300-1800 m. Fl. 5-6.

Papavéracées.

Papaver Rhœas L. Moissons : abondant partout. 1300-1800 m. Fl. 6-8.

Digitized by Google

Chelidonium majus L. Haies, vieux murs : dans presque tous les villages. Fl. 5-8.

Fumariacées.

Corydalis solida Smith. Bois taillis : Monêtier, Casset, 15-1600 m. Fl. 5.

— *fabacea Pers.* Pelouses : La Madeleine près le Lautaret, de l'Échelle aux Thures près Névache. 1800-2200 m. Fl. 6.

Fumaria Vaillantii lam. Champs : La Grave, le Monêtier, etc. 1500 m. Fl. 6.

Crucifères.

Sinapis montana DC. Lieux rocailleux : Lautaret. 2000 m. Fl. 7.

Brassica Richerii Vill. Prairies, côteaux : Arcines, Lautaret, Montgenèvre, Mont-Viso. 1900-2100 m. Fl. 6-7.

Diplotaxis repanda GG. Côteaux, ravins : Galibier, les Thures près Névache, de Briançon à Lavachette, Infernet près Briançon, vallon des Oules et col Isoard sur Cervières, Mont-Viso, col Agnel, etc. 1300-2500 m. Fl. 5-7.

— *erucastrum GG.* Côteaux : Lavachette près Briançon. 1350 m. Fl. 6-7.

Erysimum confertum Jord. Côteaux : sous le fort des Trois-Têtes à Briançon. 1400 m. Fl. 6.

— *Helveticum DC.* Côteaux : même localité que la précédente, mais plus répandue, Fl. 6.

Nasturtium officinale Duby. Lieux humides : Briançon, Névache, Cervières, etc. 1300-2000 m. Fl. 6-7.

Sisymbrium irio L. Bords des murs, des routes : Lautaret, Briançon, Cervières, etc. 1300-2000 m. Fl. 6-7.

— *Villarsii Jord.* Bords des routes : Lautaret, Mont-Viso, etc. 2000 m. Fl. 7.

— *pinnatifidum* L. Lieux pierreux : Galibier, Buffère, les Muandes sur Névache, Gondran vers la partie droite, Mont-Viso, etc. 1900-2509 m. Fl. 6-7.

Digitized by Google

Hugueninia tanacetifolia Rchb. Lieux humides et broussailleux : Lautaret à la Madeleine, Névache à Laval, Gondran, Mont-Viso, Saint-Véran en dessous de Clausis. 1800-2200 m. Fl. 5-6.

Barbarea arcuata Rchb. Côteaux : Lauzet, Briançon, Montgenèvre, etc, 13-1900 m. Fl. 6.

Arabis brassicœformis Wallr. Bois rocailleux : Monêtier, Névache, Lavachette, Montgenèvre, etc. 15-1800 m. Fl. 5.

— *saxatilis All.* Lieux pierreux : Monêtier, combe du Queyras, etc. 12-1500 m. Fl. 5-6.

— *auriculata Lam.* Côteaux : Névache, Briançon sous les forts, etc. 1300-1700 m. Fl. 5-6.

— *Serpyllifolia Vill.* Rochers : Monêtier à gauche du Tabut. 1600 m. Fl. 5-6.

— *sagittata DC.* Côteaux : Arcines, la Madeleine près le Lautaret, Monêtier, Briançon, Val-des-prés, col des Ayes, Saint-Véran, etc. 1300-2000 m. Fl. 5-6.

— *Allionii DC.* Pelouses : Mont-Viso, 2200 m. Fl. 6-7.

— *muralis Bert.* Rochers : Névache à la Tarocho, 1700 m. Fl. 4-5.

— *perfoliata Lam.* Broussailles : Monêtier. 1509 m. Fl. 4-5.

— *alpina* L. Rocailles : Névache, Montgenèvre à la collette Guignard, Cervières, Briançon, Saint-Véran à Clausis, etc., etc. 1400-2200 m. Fl. 6-7.

— *cærulea Jacq.* Rocailles : Galibier près de la limite, Névache aux Rochilles, Mont-Viso, etc. 2500 m. Fl. 8.

— *bellidifolia Jacq.* Bords des ruisseaux : Arcines, Lautaret, Gondran, Cervières, Mont-Viso, Saint-Véran aux Serènes, etc. 2000-2200 m. Fl. 6.

Cardamine Plumieri Vill. Rochers : Mont-Viso à la Traversette. 1800 m. Fl. 7.

— *alpina Vill.* Lieux frais : Galibier, Rochilles, Mont-Viso, Saint-Véran à Blanchet, etc., etc. 2500-3000 m. Fl. 7-8.

— *resedifolia* L. Lieux pierreux : Arcines, Lautaret,

Digitized by Google

Galibier,Rochilles, Mont-Viso, Saint-Véran à Blanchet et ailleurs, col de Vars, etc. 2000-3000 m. Fl. 6-7.

Dentaria digitata Lam. Bois : Lautaret à la Madeleine. 1800 m. Fl. 6.

Vesicaria utriculata Lam. Rochers : entre les châlets de l'Alp et le vallon Arcines. 2200 m. Fl. 6.

Alyssum calycinum L. Bords des champs : Monêtier, Briançon, Cervières, etc. 13-1500 m. Fl. 5-6.

— *orophilum Jord.* Pelouses, bois : Montgenèvre. 18-1900 m. Fl. 6.

— *Brigantiacum Jord.* Côteaux pierreux : du col de l'Échelle aux Thures, Montgenèvre à Gondran, col de Bousson. 2200 m. Fl. 6-7.

— *alpestre* L. Côteaux pierreux : plâteau de l'Echelle, Montgenèvre vers l'Infernet, Saint-Véran aux Serènes, etc. 1800-2200 m. Fl. 6-7.

Draba pyrenaica L. Lieux pierreux : cols de Malrif et d'Isoard, Mont-Viso, Saint-Véran à Blanchet, etc. 2300-2900 m. Fl. 6-7.

— *aizoides* L. Pelouses, bois : Monêtier, Névache à Buffère, Montgenèvre, Mont-Viso, Saint-Véran, col de Vars, etc. 1600-2200 m. Fl. 4-6.

— *tomentosa Wahl.* Rochers, pelouses : Arcines, Lautaret, Galibier, les Thures sur Névache, Terre-nière sur Cervières, Saint-Véran autour de la chapelle de Clausis, etc. 2000-2300 m. Fl. 5-7.

— *incana* L. Pelouses : Lautaret sur le versant du Villard d'Arènes. 1800-1900 m. Fl. 6.

Kernera saxatilis L. Rochers : Arcines, Monêtier, Névache, Plampinet au bois des Bauches, Briançon, Cervières, etc, 1300-2000 m. Fl. 5-6.

— *auriculata Rchb.* Rochers : Plampinet-aux-Bauches, Briançon à Malefosse, Cervières au Bardonnet, etc. 14-1600 m. Fl, 5-6.

Isatis tinctoria L. Côteaux, champs : autour de Briançon et jusqu'à Montgenèvre. 1300-1800 m. Fl. 5-6.

— *alpina All.* Débris de rochers : Mont-Viso dans le val-

Digitized by Google

lon de la Taillante, au pied des rochers les plus rapprochés du plus bas lac. 2500 m. Fl. 8.

Biscutella alpicola Jord. Côteaux : col Isoard. 2300 m. Fl. 7.

— *oreites Jord.* Rochers : au-dessus de la route d'Italie entre Briançon et Lavachette. 1400 m. Fl. 5.

Iberis pinnata Gouan. Moissons ; Névache, Val-des-prés, Lavachette, etc. 14-1600 m. Fl. 6.

Æthionema saxatile R. Br. Rochers; côteaux, graviers : Briançon, Fontenil, Val-des-prés, etc. 13-1500 m. Fl. 5-6.

Thlaspi perfoliatum L. Champs : Monêtier, Briançon, etc. 13-1500 m. Fl. 5-6.

— *alpestre* L. Prairies, bois : Monêtier, Névache, Gondran, Saint-Véran. 15-2000 m. Fl. 7-8.

— *alpinum Jacq.* Prairies : Cervières au col de Bousson, Mont-Viso, col de Vars, etc. 2000-2200 m. Fl. 6.

— *rotundifolium Gaud.* Rocailles : Cervières à Terrenière et à Venton, Mont-Viso à la Traversette, Saint-Véran à Marcel, etc. 2500 m. Fl. 7.

Hutchinsia alpina R. Br. Lieux frais et pierreux : Lautaret, Galibier, Cervières à Péas et au col Isoard, col Agnel, etc. 2000-2500 m. Fl. 6-8.

— *petræa R. Brown.* Rochers : Briançon, Lavachette, Névache, 1300-1700 m. Fl. 4-5.

Lepidium heterophyllum Benth. Pelouses : col de Vars. 2000 m. Fl. 7.

Cistinées.

Helianthemum obscurum Pers. Côteaux : Briançon. 1300 m. Fl. 6-7.

— *grandiflorum DC.* Bois : Monêtier, Briançon, Saint-Véran, etc. 1400-2000 m. Fl. 6-7.

— *pulverulentum DC.* Côteaux ; Monêtier, Briançon, Montgenèvre, Cervières. 13-1600 m. Fl. 5-6.

— *alpestre DC.* Côteaux : Monêtier, Briançon, col Isoard, Queyras, etc. 13-2000 m. Fl, 5-7.

— *œlandicum DC.* Côteaux : col Isoard. 2300 m. Fl. 7.

Digitized by Google

Fumana procumbens GG. Rochers : Briançon, etc. 1400 m. Fl. 6-8.

Violariées.

Viola pinnata L. Lieux rocailleux : Montgenèvre, Cervières au Bardonnet, col de Vars. 16-1900 m Fl. 5-6.

— *palustris L.* Lieux tourbeux : Lautaret, Névache, Gondran, Mont-Viso, col de Vars, etc. 1800-2200 m. Fl. 6-7.

Viola odorata L. Bords des champs : Lavachette. 1400 m. Fl. 4.

— *arenaria DC.* Prairies, bois : Lautaret, Monêtier, Briançon à Malefosse, Névache, Montgenèvre, col des Ayes, Saint-Véran, etc. 1600-2200 m. Fl. 5-7.

— *mirabilis* L. Prairies-bois : Puy Saint-Vincent en Vallouise. 1300 m. Fl. 5.

— *biflora* L. Lieux frais : Arcines, Lautaret, Monêtier, Névache, Montgenèvre, Cervières, col Isoard, Mont-Viso, Saint-Véran, etc. 1600-2000 m. Fl. 5-6.

— *alpestris Jord.* Champs : Monêtier, Briançon, etc. 13-1500 m. Fl. 6-7.

— *lutea Smith.* — Prairies : Névache à Fontcouvert, Briançon vers la Croix de Bretagne. 1900 m. Fl. 7.

— *calcarata* L. Prairies : partout dans les prairies alpines (c'est la violette qui est récoltée en abondance pour être vendue aux herboristes). 1800-2200 m. Fl. 5-7.

— *Zoysii Wulf.* Prairies alpines. Elle croît avec la précédente.

— *cenisia* L. Lieux pierreux : Echauda, Montgenèvre au bas du Janus, les Oules et Isoard sur Cervières, les Ayes, Mont-Viso, etc. 2000-2500 m. Fl. 6-8.

Polygalées.

Polygala alpestris Rchb. Pelouses : Lautaret, col de Vars, 2000 m. Fl. 5.

— *chamæbuxus* L. Bois : Monêtier, Briançon, Lavachette, etc. 14-1600 m. Fl. 4-5.

Digitized by Google

Silénées.

Silene alpina Thom. Côteaux pierreux : Arcines, Lautaret, Monêtier, Montgenèvre, Cervières, Mont-Viso, Saint-Véran, etc, 1600-2200 m. Fl. 6-7.

— *vallesiaca* L. Rocailles : Casset au bas et à gauche du vallon d'Arcines, Mont-Viso, Château-Queyras autour du fort. 13-1700 m. Fl. 7-8.

— *quadrifida* L. Rochers : Gondran près des sources de la Durance. 2100 m. Fl. 7.

— *rupestris* L. Pelouses rocailleuses : Arcines, Galibier, Alefroide en Vallouise, Gondran, col des Ayes sur le versant de Brunissard, etc. 2200 m. Fl. 7-8.

— *acaulis* L. Pelouses, rochers : Arcines, Galibier, Gondran, Saint-Véran, etc. 2300 m. Fl. 6-7.

— *diurna GG.* Prairies : La Madeleine, Monêtier, Lavachette, Saint-Véran, etc, 1400-2200 m. Fl. 6-7.

— *Italica Pers.* Côteaux, bois : Briançon, Lavachette, etc. 1400 m. Fl. 7.

— *pseudo otites Jord.* Côteaux, rochers : Monêtier, Briançon, Cervières, etc. 13-1800 m. Fl. 7-8.

Viscaria alpina L. Pelouses : Galibier, Névache aux Rochilles, Granon de Val-des-prés, en allant à la Crépio. 2000-2500 m. Fl. 7-8.

Lychnis flos-Jovis L. Prairies : Lautaret, la Madeleine, Granon, St-Véran, etc. 18-2000 m. Fl. 7.

Gypsophila repens L. Côteaux : Arcines, Plampinet à la Mulatière, les Oules et col Isoard sur Cervières, etc. 1500-2200 m. Fl. 6-8.

Dianthus saxifragus L. Bords des routes : de Briançon à Val-des-prés. 13-1400 m. Fl. 7-8.

— *prolifer* L. Côteaux secs : Briançon, Fontenil. 1300-1350 m. Fl. 7-8.

— *vaginatus Chaix.* Côteaux : Lautaret, Lauzet, Val-des-prés, Lavachette, Cervières près des châlets de la Chaou, 1400-2000 m. Fl. 6-7.

— *Seguierii Chaix.* Pelouses : Montgenèvre à Gondran. 2000 m. Fl. 8,

Digitized by Google

Dianthus neglectus Lois. Pelouses : Lautaret, Galibier, Gondran, Terre-nière et Malrif sur Cervières, Mont-Viso, Saint-Véran à Clausis, etc. 2000-2500 m. Fl. 7-8.

— *orophilus Jord.* Pelouses : Lautaret. 2100 m. Fl. 7.

— *Godronianus Jord.* Rochers : Névache, Briançon. 13-1700 m. Fl. 5-7.

Alsinées.

Sagina Linnæi Presl. Pelouses, élevées : La Grave, le Queyras. 2200-2500 m. Fl. 7-8.

— *glabra Willd.* Pelouses : Arcines, Galibier, Lauzet, Névache à Buffère, col Isoard, Mont-Viso, Saint-Véran, etc. 2000-2500 m. Fl. 6.

Buffonia macrosperma Gay. Lieux incultes : Briançon, bas des rampes du Mont-Genèvre. 13-1400 m. Fl.6.

Alsine mucronata L. Rochers : Lautaret, Névache, Briançon, Cervières, Mont-Viso, Saint-Véran, etc. 1300-2000 m. Fl. 6-7.

— *Villarsii M. et K.* Rochers : Mont-Viso au châlet de Ruines, la Traversette, Saint-Véran à Blanchet. 2500 m. Fl. 7-8.

— *verna Barth.* Côteaux : Lautaret à Pra-Brunet, les Oules et col Isoard sur Cervières, col de Vars, etc. 1900-2500 m. Fl. 6-8.

— *striata Gr.* Pelouses et rocailles : La Grave, de Gondran aux châlets de la Chaou sur Cervières. 2000-2300 m. Fl. 7-8.

— *Cherleri Fenzl.* Pelouses : Arcines, Galibier, col Isoard, Mont-Viso, Saint-Véran à Clausis, col de Vars, etc. 2000-2500 m. 6-7.

— *lanceolata M. et K.* Rochers : Mont-Viso, col Agnel, Saint-Véran à Clausis, etc. 2000-2400 m. Fl. 7-8.

Mœhringia muscosa L. Rochers frais, ombragés : Briançon et Lavachette, au bas des pentes de l'Infernet. 13-1400 m. Fl. 6.

Digitized by Google

Arenaria biflora L. Rochers : Névache aux Rochilles et aux Muandes, Galibier, Mont-Viso, Saint-Véran, etc. 2200-2400 m. Fl. 7-8.

— *ciliata* L. Côteaux pierreux : Cervières à Venton et à Isoard, col des Ayes, Côte-Rousse au-dessus du Villard-Saint-Pancrace, Mont-Viso, Saint-Véran à Clausis, col de Vars, etc. 2200-2500 m. Fl. 7-8.

— *grandiflora* L. Côteaux : Briançon sous le fort des Trois-Têtes, bois de l'Echelle près Plampinet, Queyras. 1350-1700 m. Fl. 7.

Cerastium trigynum Vill. Lieux élevés : Lautaret, Névache aux Muandes, Mont-Viso à la Traversette et à la Taillante. 2500 m. Fl. 7-8.

— *alpinum* L. Rocailles : Galibier, col des Ayes sur Brunissard, Mont-Viso, etc. 2400 m. Fl. 7-8.

— *latifolium* L. Débris de rochers : Galibier, Plampinet aux Aiguilles, vallon des Oules et col Isoard sur Cervières, Mont-Viso, etc. 2500 m. Fl. 7-8.

— *pedunculatum Gaud.* Côteaux : col Isoard sur la sommité. 2300 m. Fl. 7.

Linées.

Linum tenuifolium L. Côteaux secs : Briançon autour des forts et à Malefosse. 13-1400 m. Fl. 6-8.

— *alpinum* L. Prairies, bois : Lautaret, Monêtier, Mont-Viso, etc. 1500-2000 m. Fl. 6.

— *catharticum* L. Lieux frais : Lautaret, Plampinet, les Oules sur Cervières, Saint-Véran aux Serennes, etc. 1600-2500 m. Fl. 6-8.

Géraniées.

Geranium aconitifolium L'Her. Lieux humides, frais : Lautaret, Monêtier, Névache, Montgenèvre, Mont-Viso, etc. 1900-2100 m. Fl. 6.

— *sylvaticum* L. Prairies : Monêtier, Val-des-prés, Montgenèvre, etc. 15-1900 m. Fl. 7.

Erodium cicutarium L'Her. Bords des routes : Briançon, Monêtier, etc. 13-1600 m. Fl. 4-7.

Digitized by Google

Hypéricinées.

Hypericum perforatum L. Bords des champs : Monêtier, Briançon, Val-des-Prés, etc. 13-1500 m. Fl. 7.

— *delphinense Vill.* Prairies : Lautaret à Pra-Brunet. 2000 m. Fl. 7.

— *Richerii Vill.* Prairies : Lautaret, Mont-Viso, Saint-Véran, col de Vars, etc. 2000 m. Fl. 7-8.

Acérinées.

Acer opulifolium Vill. Bois : Lautaret à la Madeleine. 1900 m. Fl. 5.

— *Campestre* L. Bois de Briançon à Pramorel. 1400 m. Fl. 4-5.

Oxalidées.

Oxalis acetosella L. Bois frais : Monêtier, Briançon, Montgenèvre, Cervières, etc. 13-1800 m. Fl. 5-6.

Dictamnées.

Dictamnus albus L. Côteaux rocheux : Mont-Gauvi, près Guillestre, près des châlets de Béassac en Vallouise. 12-1300 m. Fl. 7.

Rhamnées.

Rhamnus alpina L. Côteaux : Briançon sous le fort des Trois-Têtes. etc. 130-1400 m. Fl. 5-6.

— *pumila* L. Rochers : Briançon, col Isoard, Saint-Véran, etc. 1300-2000 m. Fl. 5.

Papilionacées.

Cytisus sessilifolius L. Côteaux : autour de Briançon. 1300 m. Fl. 6.

Ononis rotundifolia L. Bois rocailleux : Névache, Plampinet, Briançon, Montgenèvre, Cervières, Queyras, etc. 13-1800 m. Fl: 5-6.

— *fruticosa* L. Côteaux : de Guillestre à la Maison du roi. 11-1200 m. Fl. 5-7.

— *cenisia* L. Pelouses, bois : Monêtier, Briançon,

Digitized by Google

Plampinet, Montgenèvre, Cervières', col Malrif, Mont-Viso, vallon Agnel, Saint-Véran, col de Vars, etc. 1300-2200 m. Fl. 4-7.

Ononis Columnæ All. Côteaux secs : Briançon aux Sallettes et à Malefosse. 13-1400 m. Fl. 6-7.

Anthyllis montana L. Côteaux, rochers : Névache, Briançon, Montgenèvre, etc. 1300-2000 m. Fl. 5.

— *Dillenii Schult.* Côteaux, pelouses : La Grave, Arcines, Lautaret, Névache, Briançon, vallon des Oules sur Cervières, etc. 1300-2400 m. Fl. 6-8.

Medicago Gerardi Wild. Bords des champs : Monêtier, Briançon. 13-1500 m. Fl. 6-7.

Melilotus officinalis Lam. Champs : Monêtier, Briançon, Lavachette, Cervières, etc. 1300-1600 m. Fl. 8-9.

— *alba Lam.* Bords des routes : Briançon et ses environs. 1300 m. Fl. 7-9.

Trifolium alpestre L. Pelouses : Lautaret, Monêtier, Névache à Fontcouvert, col de Vars, etc. 16-2000 m. Fl. 7-8.

— *pannonicum Vill.* Prairies : Lautaret, Cervières aux Devises, col de Vars, etc. 16-2200 m. Fl. 7-8.

— *thymiflorum Vill.* Graviers : Vallouise près des glaciers d'Alefroide. 2500 m. Fl. 7-8.

— *montanum* L. Bois : Lavachette, Montgenèvre, Cervières, etc. 14-1700 m. Fl. 6-7.

— *alpinum*! L. Prairies : Arcines, Lautaret, Névache aux Rochilles, Gondran, Saint-Véran à Serennes et Clausis, col de Vars, etc. 2000-2400 m. Fl. 6-8.

— *Thalii Vill.* Pâturages et débris de rochers : Lautaret, Gondran, Cervières aux Devises et au col Isoard, Saint-Véran, col de Vars, etc. 2000-2400 m. Fl. 7-8.

— *pallescens Schreb.* Pelouses : Lautaret, Cervières aux Devises, col de Vars, etc. 2000-2200 m. Fl. 7-8.

— *badium Schreb.* Prairies : Lauzet, Monêtier, Mont-Viso, etc. 1500-2000 m. Fl. 6-7.

— *spadiceum* L. Lieux tourbeux : Lautaret, Gondran, Saint-Véran à Clausis, etc. 2000-2300 m. Fl. 7.

Digitized by Google

Astragalus cicer L. Broussailles : Villard-d'Arènes, Monêtier, Briançon, etc. 13-1600 m. Fl. 6-7.

— *alopecuroides* L. Côteaux : Château-Queyras au Brasc et au-dessus de la casse de Ville-Vieille. 13-1400 m. Fl. 7-8.

— *purpureus Lam.* Bords des prairies : Briançon. 1300 m. Fl. 7-8.

— *hypoglottis* L. Côteaux : Lautaret, Monêtier, Névache, Montgenèvre, Mont-Viso, etc. 1600-2000 m. Fl. 6-7.

— *onobrychis* L. Côteaux : Lautaret, Briançon, Vallouise, Villard-Saint-Pancrace, Queyras, etc. 12-2000 m. Fl. 5-8.

— *vesicarius* L. Côteaux rocailleux : Briançon au Fontenil et sous le fort des Trois-Têtes, traverse de Prelles aux Vigneaux, raccourcis de la Bessée. 11-1300 m. Fl. 5-6.

— *austriacus* L. Côteaux, bois et rochers : Briançon autour des forts et aux Salettes, Lavachette, Val-des-Prés, etc. 13-1400 m. Fl. 6-7.

Oxytropis campestris DC. Pelouses : Lautaret, Galibier, col de Terre-nière et de Malrif sur Cervières, Mont-Viso, vallon Agnel et de Saint-Véran, etc. 2000-2500 m. Fl. 6-7.

— *fœtida DC.* Rochers : Galibier, Cervières à Terre-nière et à Malrif, Mont-Viso, col Agnel, etc. 2500 m. Fl. 7.

— *Uralensis Bunge.* Côteaux pierreux : Cervières à gauche de la plaine du Bourget et à Serre Rambaud, cols Malrif et Agnel, Saint-Véran aux rochers des Marrous, etc. 2000-2400 m. Fl. 6-7.

— *cyanea Gaud.* Côteaux : Galibier, Cervières à Malrif, Mont-Viso, col Agnel, etc. 2000-2500 m. Fl. 7-8.

— *montana DC.* Côteaux : Galibier, cols Malrif et Isoard, Saint-Véran à Serennes, etc. 2200-2400 m. Fl. 6-7.

— *lapponica Gaud.* Broussailles : Lautaret, Galibier aux

Digitized by Google

Chalets, Mont-Viso vers la Traversette, Saint-Véran à Clausis, etc. 2000-2300 m. Fl. 6-7.

Oxytropis pilosa DC. Côteaux : Briançon sous le fort des Trois-Têtes. 1300-1400 m. Fl. 6-7.

Phaca alpina Wulf. Pelouses et débris de rochers : Lautaret, Galibier, Mont-Viso, Saint-Véran à Clausisset, col de Vars, etc. 2000-2500 m. Fl. 8

— *astragalina DC.* Pelouses : Arcines, Lautaret, la Madeleine, Echauda, Cervières à Pra-Fauchier col des Ayes, Mont-Viso, Saint-Véran aux Trois-Pierres, col de Vars, etc. 1900-2500 m. Fl. 6-7.

— *australis* L. Pelouses, Côteaux : cols Isoard et Malrif sur Cervières, Mont-Viso à la Taillante, Saint-Véran à Clausis, etc. 2300 m. Fl. 7.

— *Gérardi Vill.* Rochers : Chardonnet, Névache au Vallon, Prorel, col des Ayes, Mont-Viso, col Vieux en Queyras, etc. 2000-2400 m. Fl. 7-8.

Vicia onobrychioides L. Côteaux : Monêtier, Briançon, Lavachette, Cervières, Saint-Véran, etc. 1300-2000. m. Fl. 6-7.

— *sylvatica* L. Bois : Lautaret, Val-des-prés à Granon, Queyras, etc. 2000 m. Fl. 7-8.

Cracca Gerardi GG. Côteaux : Lautaret, Château-Queyras. 14-2000 m. Fl. 7.

Lathyrus heterophyllus L. Côteaux : Monêtier, Lavachette, Cervières au-dessus des châlets de la Chaou, Villard-d'Arènes, etc. 14-1900 m. Fl. 6-7.

Orobus vernus L. Bois frais : Monêtier, Briançon, Cervières, etc. 13-1700 m. Fl. 5.

— *luteus* L. Prairies : Lautaret, Montgenèvre, Saint-Véran, col de Vars, etc. 1800-2200 m. Fl. 7.

Coronilla vaginalis L. Côteaux, bois : Lavachette, Montgenèvre, Cervières. 14-1900 m. Fl. 6-7.

Hedysarum obscurum L. Bois frais, bords des ruisseaux : Cervières au bois de ville et au Clotet, col Malrif, Mont-Viso, vallon Agnès, Saint-Véran sous Rocheronde. 1900-2300 m. Fl. 7.

Digitized by Google

Onobrychis saxatilis All. Bois rocailleux : Lavachette, Briançon, vallée de Cervières. 13-1500 m. Fl. 6-7.

Rosacées

Prunus Brigantiaca Vill. Côteaux, bords des sentiers : Monêtier, Briançon, Névache, Val-des-Prés, Ville-Vieille-en-Queyras, etc. 13-1600 m. Fl. 4.

Spiræa ulmaria L. Lieux humides : Monêtier, Briançon, Lavachette, etc. 13-1600 m. Fl. 6-7.

— *filipendula* L. Prairies : Queyras, col de Vars. 2200 m. Fl. 7.

Dryas octopetala L. Bois, rochers : Monêtier, Briançon, Lavachette, Cervières aux Oules et à Isoard, St-Véran, etc., etc. 13-2500 m. Fl. 5-6.

Geum montanum L. Bois, prairies : Lautaret, Montgenèvre, Cervières, Mont-Viso, St-Véran, col de Vars, etc. 18-2200. Fl. 5-6.

— *rivale* L. Prairies humides : Monêtier, Névache, Montgenèvre, St-Véran, col de Vars, etc. 1500-2200 m. Fl. 7.

— *reptans* L. Eboulis : Galibier, Terre-nière et Venton sur Cervières, au-dessus et à droite de Clausis sur St-Véran, etc. 3000 m. Fl. 7-8.

Sibbaldia procumbens L Pelouses : Galibier, Cervières à Terre-nière, Mont-Viso, St-Véran à Blanchet et à Marcel, col de Vars, etc. 2500-3000 m. Fl. 7.

Potentilla caulescens L. Rochers : Briançon, Lavachette, Névache, Montgenèvre, Cervières, Queyras, etc. 13-1700 m. Fl. 7-8.

— *nivea* L. Prairies sèches : Lautaret sur le versant du Villar d'Arêne. 1900 m. Fl. 5.

— *minima Hall.* Prairies : Arcines, Galibier, Echauda, Dormillouse sur Val-des-Prés, Terre-nière près Cervières, col Isoard, Mont-Viso, etc. 2200-2500 m. Fl. 6-7.

— *frigida Vill.* Lieux pierreux : Névache aux Muandes, cols de Buffère et de Cristol, Mont-Viso, cols Vieux et Agnel en Queyras. 2200 m. Fl. 7-8.

Digitized by Google

Potentilla grandiflora L. Prairies : Lautaret, Gondran, Mont-Viso, Saint-Véran, col de Vars, etc. 2000 m. Fl. 7-8.

— *pedemontana Reut.* Prairies : Lautaret, col de Vars, etc. 2000 m. Fl. 7-8.

— *alpestris Hall.* Pelouses : Lautaret, Névache, Mont-Viso. etc. 2000 m. Fl. 7-8.

— *aurea* L. Pelouses : Lautaret, Montgenèvre, Cervières, St-Véran, col de Vars, etc. 2000 m. Fl. 6-7.

— *intermedia* L. Bords des prairies : Lautaret, Lauzet, Briançon au Fontenil, etc. 13-2000 m. Fl. 6.

— *Delphinensis GG.* Prairies pierreuses : Lautaret, Chantemerle aux Eduits, col de Vars. 2000 m. Fl. 7.

— *multifida* L. Pelouses : Lautaret sur le versant du Villard-d'Arènes. 1900 m. Fl. 5.

— *tormentilla Duby.* Lieux humides : Lautaret, Lavachette, Montgenèvre, St-Véran, col de Vars, etc. 1400-2200 m. Fl. 5-7.

— *reptans* L. Bords des chemins : Briançon, Lavachette, etc. 13-1400 m. Fl. 6-8.

— *anserina* L. Lieux humides, fossés : Monêtier, Briançon, Val-des-Prés, Plampinet, Montgenèvre, Cervières, etc. 1300-1800 m. Fl. 6-7.

— *rupestris* L. Rochers, bois : Arcines, Lautaret, Briançon, Monêtier, Queyras, etc. 13-1900 m. Fl. 6-7.

Rubus saxatilis L. Bois pierreux : Lautaret, Monêtier, Lavachette, Mont-Viso, etc. 16-2000 m. Fl. 6-7.

— *idœus* L. Lieux pierreux : Plampinet dans les Acles, Val-des-Prés au Pinet, Lavachette, La Madeleine, Villard-St-Pancrace, Cervières, etc. 14-2000 m. Fl. 7.

Rosa pimpinellifolia Ser. Côteaux : Briançon, Monêtier, Lavachette, Montgenèvre, etc. 13-1600 m. Fl. 6.

— *alpina* L. Bois : Monêtier, Gondran, col des Ayes, col Malrif, Mont-Viso, etc. 1800-2200 m. Fl. 6.

Digitized by Google

Rosa rubrifolia Vill. Côteaux : Briançon, Montgenèvre, Abriès, etc. 1300-1800 m. Fl. 6.

— *montana Chaix.* Côteaux : Monêtier, Briançon, Montgenèvre, etc. 13-1800 m. Fl. 6-7.

(Le genre Rose a été tellement subdivisé ces temps derniers qu'il m'est impossible de donner en ce moment la liste complète des nombreuses et belles espèces qui croissent dans les Alpes briançonnaises).

Agrimonia eupatoria L. Bords des routes, fossés : Briançon, Fontenil, Lavachette, Val-des-Prés, etc. 13-1500 m. Fl. 7-8.

Sanguisorba officinalis L. Prairies humides : Arcines, Lautaret. 2000 m. Fl. 7.

Alchemilla alpina L. Côteaux, bois : Lautaret, Buffère, Rochilles, Montgenèvre, Mont-Viso, St-Véran, etc. 15-2000 m. Fl. 6-8.

- *vulgaris* L. Prairies : Lautaret, Briançon, Montgenèvre, etc. 13-2000 m. Fl. 7-8.

— *montana Wild.* Côteaux : de Briançon à l'Infernet, etc. 1500-2000 m. Fl. 6-7.

— *fissa Schumm.* Bords des ruisseaux : Lautaret, Galibier, Arcines, Rochilles, Mont-Viso, etc. 2000-2500 m. Fl. 7-8.

— *pentaphyllea* L. Pelouses : Lautaret vers le Haut-Richard, Galibier, Chardonnet, les Acles, les Rochilles, Mont-Viso, col Agnel, St-Véran à Clausis, etc. 2200-3000 m. Fl. 8.

Cotoneaster tomentosa Lindl. Bois, rochers : Monêtier, Gondran, St-Véran aux Serennes, col de Vars, etc. 1400-2200 m. Fl. 6.

Sorbus chamæmespilus Crantz. Rochers : Lautaret à Pra-Brunet, col des Ayes, Mont-Viso, col de Vars, etc. 2000 m. Fl. 6.

Amelanchier vulgaris Mœnch. Bois pierreux : à peu près partout. 14-2000 m. Fl. 5.

Onagrariées

Epilobium origanifolium Lam. Lieux humides : Lautaret, Névache à Font-Couvert, Gondran, col des Ayes, Mont-Viso, etc. 2000-2200 m. Fl. 7.

Digitized by Google

Epilobium alpinum L. Lieux frais : Lautaret, Rochilles, cols des Ayes et de Vars, etc. 2200-2500 m. Fl. 7-8.

— *collinum Gmel.* Lieux pierreux : de Cervières au Bourget. 1900 m. Fl. 7.

— *Fleischerii Vill.* Graviers des torrents : La Madeleine près le Lautaret, vallée de la Clarée, Lavachette, Montgenèvre, Briançon, les Ayes, St-Véran, etc. 1300-1900 m. Fl. 7-8.

Tamariscinées

Myricaria germanica Desv. Graviers des torrents : Monêtier, Briançon, Cervières, etc. 13-1600 m. Fl. 6.

Paronychiées.

Telephium Imperati L. Rochers : Briançon, Guillestre 1000-1300 m. Fl. 6-7.

Paronychia polygonifolia DC. Côteaux : Lautaret à Pra-Brunet. Galibier, Mont-Viso, col de Vars, etc. 2000-2500 m. Fl. 7-8.

— *serpyllifolia DC.* Rochers : Briançon sous les forts 1350 m. Fl. 5-6.

Herniaria hirsuta L. Bois : Briançon au-dessus du cimetière 1400 m. Fl. 6-7.

— *alpina* L. Sables : Lautaret, Galibier, Cervières au Bourget, Mont-Viso, St-Véran aux Serènes près de la rivière, etc. 2000-2400 m. Fl. 7.

Scleranthus perennis L. Bois : Buffère sur Névache 1800 m. Fl. 7-8.

Crassulacées.

Sedum rhodiola DC. Rochers : St-Véran à Blanchet Mont-Viso 2500 m. Fl. 7.

— *anacampseros* L. Bois, rochers : Lautaret, Névache à Laval, Montgenèvre, Queyras, col de Vars, etc. 2000 m. Fl. 8.

Digitized by Google

Sedum atratum L. Lieux pierreux : Arcines, Lautaret, les Rochilles, les Sauréots du Montgenèvre, cols Malrif et Agnel, Saint-Véran à Marcel, etc. 2-3000 m. Fl. 6-7.

— *annuum* L. Rochers: Briançonnais et Queyras. 2-2200 m. Fl. 6-7.

— *alpestre Vill.* Rochers : Galibier, Cervières, col des Ayes, Viso, col de Vars, etc. 2500 m. Fl. 6.

Sempervivum montanum L. Rochers: Névache, Montgenèvre, col de Vars, etc. 17-2000 m. Fl. 8.

— *arachnoideum* L. Rochers : Lautaret, Montgenèvre, Gondran, etc. 17-2000 m. Fl. 7.

Grossulariées.

Ribes uva-crispa L. Bords des routes et des champs : Monêtier, Briançon, Cervières, etc. 12-1800 m. Fl. 4-5.

— *alpinum* L. Rocailles : Monêtier, Pramorel près Briançon 14-1500 m. Fl. 6.

— *Petræum Wulf.* Bois : Lautaret à la Madeleine, Laval et la Gardiole près Névache, col des Ayes, Mont-Viso, etc. 18-2000 m. Fl. 6.

Saxifragées.

Saxifraga stellaris L. Lieux tourbeux : Lautaret, Névache au Queyrelin et au Chardonnet, la Ponsonnière, Mont-Viso, etc. 2000-2400 m. Fl. 8.

— *cuneifolia* L. Bois, rochers : Monêtier, Val-des-Prés, Névache, les Ayes, etc. 18-2200 m. Fl. 6-7.

— *rotundifolia* L. Bois frais : Arcines, Névache, Mont-Genèvre, Cervières, etc. 18-2200 m. Fl. 7-8.

— *aspera* L. Rochers, côteaux : Arcines, col des Ayes, Mont-Viso, St-Véran à Cornevier et à Blanchet, col de Vars, etc. 2300 m. Fl. 8.

— *bryoides* L. Rochers : Lautaret, la Ponsonnière, Mont-Viso, St-Véran à Blanchet et à Marcel, etc. 2000-2500 m. Fl. 7-8.

Digitized by Google

Saxifraga aizoides L. Lieux humides : Partout assez abondante 14-2000 m. Fl. 7-8.

— *petræa* L. Côteaux : Mont-Viso à la Traversette et à Ruines, St-Véran à Clausis, entre la Chapelle et le ruisseau. 2300 m. Fl. 7.

— *exarata Vill.* Rochers : Lautaret, Mont-Viso à la Traversette, etc. 2000-2500 m. Fl. 7.

— *muscoides Wulf.* Débris de pierres : les Sauréots à Montgenèvre, les Oules, cols Isoard et des Ayes, St-Véran à Clausis, etc. 2000-2300 m. Fl. 6-8.

— *androsacea* L. Lieux frais : Arcines, Galibier, les Rochilles, pic Chenailler sur Montgenèvre, Terrenière sur Cervières, St-Véran, etc. 2000-2500 m. Fl. 6-7.

— *planifolia Lap.* Rochers : Galibier, Mont-Viso à la Taillante. 2500 m. Fl. 7-8.

— *diapensoides Bell.* Rochers : Mont-Viso à Ruine et à la Traversette. 2000-2500 m. Fl. 6-7.

— *cæsia* L. Rochers, côteaux : Plampinet aux Rousses, vallon des Oules sur Cervières, Rochemoutte sur Villard-St-Pancrace. 2000-2400 m. Fl. 7-8.

— *Valdensis DC.* Rochers : Mont-Viso sur la crête des cols Albert et Lacroix. 2800-3000 m. Fl. 8.

— *oppositifolia* L. Rochers et rocailles : Lautaret, Galibier, Lavachette au bois des Bans, Gondran, cols Malrif et Isoard, Mont-Viso, etc. 1500-2500 m. Fl. 5-7.

— *biflora All.* Rocailles : Galibier, Terre-niere sur Cervières, col Malrif, Mont-Viso, St-Véran à Blanchet, etc. 2500-2800 m. Fl. 7.

— *retusa Gouan.* Rocailles : Lautaret en face de l'hospice, Galibier, Mont-Viso au col de la Traversette et de la Valante. 2200-2900 m. Fl. 7-8.

Ombellifères

Laserpitium latifolium L. Prairies : Lautaret, Monêtier, etc. 1600-2000 m. Fl. 6-7.

— *gallicum C. Bauh.* Côteaux pierreux : Monêtier,

Digitized by Google

Briançon, Montgenèvre, Cervières, Queyras, etc. 13-1800 m. Fl. 7.

Laserpitium siler L. Rochers et bois : Lautaret. 2000 m. Fl. 7-8.

— *panax Gouan.* Prairies : Lautaret, Monêtier, Névache, col de Vars, etc. 16-2000 m. Fl. 7-8.

Levisticum officinale Koch. Dans tous les jardins des villages. 15-1800 m. Fl. 7-8.

Peucedanum Ostruthium L. Lieux frais, bords des ruisseaux : Lautaret, Gondran, Mont-Viso, St-Véran, col de Vars, etc. 2000-2200 m. Fl. 7.

Gaya simplex Gaud. Pelouses : Arcines, Galibier, Rochilles, Gondran, Cervières à Venton, col des Ayes, côtes Rousses sur Villard-St-Pancrace, St-Véran à Clausis, etc. 2300-2600 m. Fl. 6-7.

Meum athamanticum Jacq. Prairies : Lautaret, Gondran, Mont-Viso, col de Vars, etc. 2000 m. Fl. 6.

— *mutellina Gœrtn.* Pelouses : Lautaret, Galibier, Mont-Viso, col de Vars, etc. 2000-2500 m. Fl. 6-7.

Athamanta Cretensis L. Rochers : Lautaret, Monêtier, Cervières, Mont-Viso, St-Véran à Clausisset, col de Vars, etc. 1500-2200 m. Fl. 7-8.

— *mutellinoides Lam.* Rochers : Cervières au bois de ville et aux Oules. 1800-2500 m. Fl. 7-8.

— *Seseli carvifolium Vill.* Rochers : Névache à l'Alta Rocho. 1700 m. Fl. 7.

— *libanotis Koch.* Rochers : St-Véran à la casse Rouchouse. 2300 m. Fl. 7-8.

Buplevrum longifolium L. Bois : Lautaret à la Madeleine, Queyras, Guillestre au Mélezet. 1800 m. Fl. 7-8.

— *stellatum* L. Rochers : Arcines, Lautaret, entre Laval et les Rochilles, Mont-Viso, etc. 2-2400 m. Fl. 6-7.

— *caricifolium Jord.* Bois, rochers : Briançon, Val-des-Prés aux Bauches ; Cervières. etc. 13-1500 m. Fl. 7.

Digitized by Google

Buplevrum petræum L. Rochers : Lautaret, Mont-Viso. 2200 m. Fl. 7-8.

Bunium Carvi Duby. Prairies : Monêtier, Montgenèvre, Cervières, St-Véran, etc. 1500-2200 m. Fl. 7.

Ptychotis heterophylla Koch. Lieux secs et pierreux : abondante autour de Briançon. 13-1500 m. Fl. 7-8.

Chœrophyllum Villarsii Koch. Bois : Lautaret, Monêtier, Mont-Viso, col de Vars, etc. 16-2000 m. Fl. 7-8.

Pleurospermum austriacum Hoff. Prairies, bois : les Fréaux près la Grave, Lautaret. 1900 m. Fl. 7-8.

Conium maculatum L. Décombres : Lavachette près Briançon, Château-Queyras. 1400 m. Fl. 7-8.

Æthusa cynapium L. Bords des routes, jardins : Névache, Val-des-Prés, Briançon, etc. 13-1700 m. Fl. 6-7.

Astrantia major L. Prairies : Lautaret, Monêtier, Ville-Vieille en Queyras, etc. 1400-2000 m. Fl. 7.

— *minor* L. Pelouses pierreuses : Lautaret à Pra-Brunet, Briançon à Malafosse, etc, 15-1900 m. Fl. 7-8.

Eryngium alpinum L. Prairies, bois : montagnes de l'Argentière, Mont-Viso ; du refuge du col de Vars, en montant sur la droite et allant vers les Basses-Alpes, Mélezet près Guillestre, etc. 2000 m. Fl. 7-8.

Loranthacées

Viscum laxum Boiss. et R. Parasite sur le pin sylvestre : Briançon, Château-Queyras. 13-14000 m. Fl. 10-11.

Caprifoliacées

Sambucus racemosa L. Côteaux : Arcines, Lauzet, Monêtier, Val-des-Prés, Cervières, etc. 1400-2000 m. Fl. 5 6.

Lonicera nigra L. Bois : la Madeleine près le Lautaret 1800 m. Fl. 6.

— *alpigena* L. Bois pierreux : Arcines, Monêtier à Charvet, Névache, etc. 1600-2000 m. Fl. 6.

Digitized by Google

Lonicera cœrulea L. Lieux pierreux et tourbeux : Lautaret, Névache à Laval, Gondran, Mont-Viso, col de Vars, etc. 2000-2200 m. Fl. 5.

Rubiacées

Galium Halleri L. Prairies, bois : Montgenèvre, Gondran, col de Vars, etc. 1800-2100 m. Fl. 6-7.

— *Bauhini Lois.* Prairies, bois : Montgenèvre avec le précédent.

— *boreale* L. Prairies : Lautaret, Montgenèvre, col de Vars, etc. 1800-2200 m. Fl. 6-7.

— *verum* L. Bords des prairies : Briançon, Lavachette, etc., etc. 13-2000 m. Fl. 6-7.

— *glaucum* L. Bords des routes : Briançon au Fontenil et à Fontchristiane, etc. 13-1400 m. Fl. 7.

— *corrudœfolium* L. Côteaux : Monêtier, Briançon, Montgenèvre. etc. 13-1800 m. Fl. 7.

— *myrianthum Jord.* Bois : l'Echelle sur Plampinet. 1700 m. Fl. 7.

— *alpicola Jord.* Côteaux : Monêtier, Briançon, Lavachette, Montgenèvre, etc. 13-1800 m. Fl. 7.

— *brachypodum Jord.* Lieux pierreux : col de l'Echelle, Névache. 17-1800 m. Fl. 7.

— *anisophyllon Vill.* Bois herbeux, pelouses : Gondran, Cervières ou bois de ville 18-2000 m. Fl. 7.

— *argenteum Vill.* Bois : Lautaret, Montgenèvre. 19-2000 m. Fl. 7-8.

— *tenue Vill.* Pelouses : Lautaret, Montgenèvre, Gondran, cols Isoard et des Ayes. 19-2200 m. Fl. 7-8.

— *pusillum* L. Rochers : Monêtier, Infernet-sur-Briançon, Cervières. 1600-2300 m. Fl. 7.

— *helveticum Weigg.* Côteaux : Lautaret, Galibier, Mont-Viso, col de Vars, etc. 2-3000 m. Fl. 7.

Asperula Jordani Perr. et Song. Bois, rochers : Briançon, Névache à l'Altarocho. 1350-17000 m. Fl. 7.

— *longiflora W. et K.* Rochers : Briançon, Vallouise, Queyras, etc. 12-1400 m. Fl. 7-8.

— *odorata* L. Bois : Lautaret à la Madeleine. 1900 m. Fl. 6.

Digitized by Google

Valérianées

Centranthus angustifolius DC. Côteaux et graviers : Abondante partout. 13-1900 m. Fl. 6-7.

Valeriana officinalis L. Bords des ruisseaux, bois : Briançon, Monêtier, Névache, etc. 13-1800 m. Fl. 7-8.

— *montana* L. Rochers : Lautaret, Monêtier, Mont-Genèvre, vallée de Cervières, col Isoard, col de Vars, etc. 1500-2000 m. Fl. 5-7.

— *saliunca All.* Lieux pierreux : Arcines, Galibier, Echauda à l'extrémité du plateau, Aiguille rouge sur Plampinet, Infernet près Briançon, col Isoard, etc. 2300-2500 m. Fl. 6-8.

Dipsacées

Knaulia dipsacifolia Host. Prairies : Lautaret. 2000 m. Fl. 7.

— *subcanescens Jord.* Même localité et même époque de floraison.

— *carpophylax Jord.* Prairies : Villard-d'Arênes, Lautaret, le Poët près Briançon, combe du Queyras. 1100-2000 m. Fl. 7.

Scabiosa gramintfolia L. Rocailles : Villard-d'Arênes, Queyras. 1200-1600 m. Fl. 6-7.

— *glabrescens Jord.* Prairies : Lautaret. 2000 m. Fl. 7.

— *Brigantiaca Jord.* Côteaux : Névache à l'Echelle, les Roux près Abriès. 1700 m. Fl. 7.

Synanthérées

Adenostyles albifrons Rchb. Forêts, lieux humides : Lautaret. 1900 m. Fl. 8.

— *alpina Bl. et Fing.* Bois : Monêtier au Tabut, Mont-Genèvre, Cervières, etc. 16-1800 m. Fl. 7.

— *leucophylla Rchb.* Lieux pierreux : Arcines, Lautaret, Mont-Viso, St-Véran à casse Rouchouse, etc. 2000-2300 m. Fl. 8.

Digitized by Google

Homogyne alpina Cass. Bois et pelouses : Arcines, Lautaret à Pra-Brunet, Buffère et Rochilles-sur-Névache, Gondran, col Isoard, Mont-Viso, etc. 2000-2400 m. Fl. 6.

Petasites albus Gœrtn. Bords des ruisseaux : Monêtier, Plampinet aux Bauches, etc. 15-1800 m. Fl. 6.

— *nivea Vill.* Bords des ruisseaux : Lautaret. 2000-2200 m. Fl. 6.

Tussilago farfara L. Lieux argileux : partout. 1200-2000 m. Fl. 3-5.

(J'ai trouvé au Monêtier de Briançon, dans les sables de la Guisanne, une forme de T. farfara ayant plusieurs capitules sur la même tige, tandis que le type normal n'en a qu'un.)

Solidago minuta Gaud. Eboulis : Lautaret, Mont-Viso. 2000 m. Fl. 7-8.

— *patulifolia Jord.* Bois ; Briançon à la Pinée. 1400 m. Fl. 7.

Erigeron glabratus Hoppe. Graviers : Vallouise près les glaciers d'Alefroide. 2500 m. Fl. 8.

— *Villarsii DC.* Prairies : Lautaret, Granon sur Val-després, Gondran, Mont-Viso, Saint-Véran, col de Vars, etc. 2000-2200 m. Fl. 8.

— *alpinus* L. Rochers, pelouses : Lautaret, Galibier, Gondran, Mont-Viso, Saint-Véran, col de Vars, etc. 20-2500 m. Fl. 7-8.

— *uniflorus* L. Pelouses : Arcines, Galibier, Buffère, Cervières au Clotet, Mont-Viso, etc. 2000-2600 m. Fl. 6-8.

Aster alpinus L. Côteaux secs, rochers : Lautaret, Monêtier, Briançon, Mont-Viso, col de Vars, etc. 1300-2000 m. Fl. 7.

Bellidiastrum Michelii Cass. Rochers, bois frais : Arcines, Lautaret, Monêtier, Briançon, Lavachette, col Isoard, Mont-Viso, Saint-Véran, col de Vars, etc. 1300-2000 m. Fl. 5-6.

Aronicum Doronicum Rchb. Côteaux pierreux : Mont-Viso, cols Agnel et Vieux, Saint-Véran au bas du col de la Nièro. 2500 m. Fl. 7.

Digitized by Google

Aronicum scorpioides DC. Eboulis : Lautaret, Galibier, Mont-Viso, col Vieux, Saint-Véran à Blanchet, etc. 2000-2500 m. Fl. 7.

Arnica montana L. Prairies : Lautaret, Gondran, Mont-Viso, Saint-Véran à Clausis, col de Vars, etc. 2000-2300 m. Fl. 7-8.

Senecio incanus L. Lieux pierreux : Lautaret, Gondran, les Oules sur Cervières, Mont-Viso, Saint-Véran, col de Vars, etc. 2000-2500 m. Fl. 8.

— *sarracenicus* L. Bois : Lautaret à la Madeleine. 1800 m. Fl. 7.

— *Doronicum* L. Côteaux : Lautaret, Briançon, Montgenèvre, Cervières dans les Oules, Mont-Viso, col de Vars, etc. 1300-2500 m. Fl. 7-8.

— *Barrelierii Gouan.* Côteaux : Granon sur Val-des-prés, Montgenèvre, Saint-Véran, etc. 1800-2000 m. Fl. 7-8.

Tephroseris aurantiaca Jord. Prairies humides : Mont-Viso, vallon Agnel, Saint-Véran aux Serennes, etc. 2200-2400 m. Fl. 7.

— *lanuginosa Jord.* Pelouses sèches : Saint-Véran dans les pentes de Clausisset, col de Vars, etc. 2300 m. Fl. 7-8.

— *fuscata Jord*, Prairies : Mont-Viso au vallon de Ruines, rives du Guil. 2000-2500 m. Fl. 7-8.

Artemisia glacialis L. Rochers : Cervières à Terro-nière et à Péas, Mont-Viso à Ruines, col Agnel, etc. 2200-2500 m. Fl. 7-8.

— *mutellina Vill.* Rochers : Arcines, Lautaret, Mont-Viso, Saint-Véran à Clausisset, etc. 2000-2400 m. Fl. 8.

Artemisia absinthium L. Bords des champs : Monêtier, Briançon autour des forts, Névache, etc. 13-1800 m. Fl. 8.

— *spicata* L. Rochers : Galibier, Terre-nière sur Cervières, Mont-Viso à Ruines, etc. 2500 m. Fl. 8.

— *Vilarsii GG.* Côteaux rocheux : au-dessus du bois de la Madeleine près le Lautaret. 2000 m. Fl. 7.

Digitized by Google

Artemisia tanacetifolia All. Prairies, côteaux herbeux : Lautaret sur le versant de Villard-D'Arènes, au-dessus des châlets du Puy-Chevalier près le Monêtier, 18-1900 m. Fl. 7.

— *nana Gaud.* Bord des routes : La Grave. 1500 m. Fl. 8.

— *vulgaris* L. id. Briançon, etc. 1300 m. Fl. 8.

— *chamœmolifolia Vill.* Lieux pierreux ; Lautaret, vallée de Vars. 1900 m. Fl. 8.

Leucanthemum atratum Gaud. Côteaux : Buffère sur le versant de Névache. 2000 m. Fl. 7.

— *maximum* DC. Bois : Lautaret, Lavachette et Montgenèvre aux bois des Bancs et des Sestrières, Cervières au bois de ville, etc. 15-2000 m. Fl. 7-8.

— *coronopifolium GG.* Côteaux pierreux : Cervières aux Fonds et aux Oules, Saint-Véran, col de Vars, etc. 2200-2500 m. Fl. 7-8.

— *alpinum Lam.* Côteaux pierreux : Arcines, Lautaret à Pra-Brunet, Galibier, Névache, col de Vars, Saint-Véran, etc. 1900-2400 m. Fl. 6-7.

Achillea millefolium L. Prairies et bords des champs : partout. 12-2000 m. Fl. 6-8.

— *tanacetifolia All.* Prairies : Lautaret sur le versant du Villard-d'Arènes, Mont-Viso à Ruines, etc. 1900-2200 m. Fl. 7-8.

— *dentifera* L. Prairies : Lautaret, Mont-Viso, col de Vars, etc. 1900-2200 m. Fl. 8.

— *ptarmica* L. Vieux murs : Lavachette à l'entrée de la route de Val-des-Prés. 1400 m. Fl. 7-8.

— *herba-rota* L. Rochers : Mont-Viso depuis le rocher de Côte-ronde jusqu'au col de la Traversette, col de Ruines, etc. 2400 m. Fl. 8.

— *macrophylla* L. Bois : Lautaret à la Madeleine, Mont-Viso. 18-1900 m. Fl. 7-8.

— *nana* L. Eboulis : Lautaret. Galibier, Terre-nière sur Cervières, col des Ayes, Mont-Viso, Saint-Véran, etc. 2500 m. Fl. 7-8.

Digitized by Google

Buphthalmum grandiflorum L. Côteaux, bois : Lavachette, Val-des-prés, Névache, Montgenèvre, etc. 14-1800 m. Fl. 7.

Inula montana L. Côteaux, rochers : Briançon sous les forts. 13-1400 m. Fl. 7-8.

Antennaria carpatica Bl. et Fing. Pelouses : Arcines, Lautaret, Galibier, Rochilles sur Névache, Gondran, col Isoard, Mont-Viso, cols Vieux et de Vars, etc. 2000-2300 m. Fl. 6-8.

— *dioica Gœrtu.* Pelouses, bois : Monêtier, Briançon. Névache, Saint-Véran, etc. 1400-2000 m. Fl. 6-7.

Guaphalium Norwegicium Gunn. Prairies : Lautaret, bois du Casset, Rochilles sur Névache. 1800-2200 m. Fl. 7-8.

— *supinum* L. Pelouses : Lautaret, Galibier, Echanda, cols Isoard et des Ayes, Mont-Viso, etc. 20-2300 m Fl. 7-8.

Leontopodium Alpinum Cas. Côteaux : Lautaret, Cervières à Malrif, aux Oules et à Isoard, Mont-Viso, Saint-Véran à Clausis, col de Vars, etc. 2000-2400 m. Fl. 7-8.

Echinops ritro L. Côteaux, bords des routes : La Grâve, Briançon, La Vachette, Cervières, etc. 13-1700 m. Fl. 8.

— *sphrœrocephalus* L. Côteaux : La Grâve, Monêtier, Aiguilles en Queyras. 14-1500 m. Fl. 8-9.

Onopordon acanthium L. Lieux incultes : autour de Briançon. 12-1300 m. Fl. 7-8.

Cirsium monspessulanum All. Bords des canaux : Briançon, Monêtier, Vallouise, etc. 1100-1500 m. Fl. 7-8,

— *spinosissimum* L. Lieux frais : Lautaret, Gondran. les Oules sur Cervières, Mont-Viso, Saint-Véran à Clausis et à Blanchet, col de Vars, etc. 2000-2500 m Fl. 8.

— *spinosissimo heterophyllum GG.* Lieux humides : Lautaret. 2000 m. Fl. 8.

— *heterophyllo-spinosisstmum Nœg.* Lieux humides :

Digitized by Google

Lautaret à Pra-Brunet et à Prime-messe. 1900-2000 Fl. 8.

Cirsium heterophyllum All. Prairies: Lautaret. 2000 m. Fl. 8.

Carduus carlinœfolius Godr. Côteaux herbeux : Galibier, Monêtier, Saint-Véran, col Agnel, etc. 17-2200 m. Fl. 7-8.

— *defloratus* L. Bords des routes : Lautaret, Monêtier, col de Vars, etc. 16-2200 m. Fl. 7.

Rhaponticum helenifolium Godr. Côteaux : au-dessus de Granon près Val-des-prés, fort des Salettes près Briançon. 15-1900 m. Fl. 7-8.

Centaurea uniflora L. Prairies : Lautaaet, Névache, Montgenèvre à Gondran, Mont-Viso, Saint-Véran, col de Vars, etc. 2000-2300 m. Fl. 7-8.

— *nervosa Vill.* Prairies, bois : col des Ayes, Mont-Viso, col de Vars, etc. 2000-2400 m. Fl. 8.

— *montana* L. Qrairies : Lautaret, Montgenèvre, Cervières, Mont-Viso, col de Vars, etc. 18-2200 m. Fl. 7-8.

— *Willaris Willd.* Prairies: Mont-Viso, col Agnel, col de Vars, etc. 2000-2200 m. Fl. 7-8.

— *Kotschyana Heuff.* Pâturages : Lautaret, Mont-Viso, col de Vars, etc. Fl. 7-8.

— *maculosa Lam.* Côteaux : Briançon sous le fort des Trois-Têtes. 1400 m. Fl. 7.

— *leucophœa Jord.* Côteaux : autour de Briançon, Lavachette, etc, 13-1400 m. Fl. 7-8.

Crupina brachypappa Jord. Côteaux : Briançon. 1300-1400 m. Fl. 7-8.

Berardia subacaulis Vill. Débris pierreux : Val-des-prés à Roche-Gautier et à la Lauze, col Isoard sur les deux versants, col des Ayes et Côte-rousse près le Villard-Saint-Pancrace, Infernet près Briançon, etc. 2000-2400 m. Fl. 8.

Saussurea depressa Gren. Eboulis : Galibier sur le versant de Savoie, Mont-Viso, etc. 2500 m. Fl. 8.

Digitized by Google

Carlina caulescens Lam. Côteaux: Briançon, Lavachette, etc. 13-1400. m. Fl. 7-8.

— *acanthifolia All.* Côteaux, bois de Lavachette à Montgenèvre, de Briançon à l'Infernet, vallée de Cervières, etc. 1400-1700. m. Fl. 7-8.

Lappa minor, DC. Bords des chemins : Névache, Val-des-Près, Lavachette, Briançon, vallées du Monêtier et de Cervières, etc. 1300-1600 m. Fl. 7-8.

Xeranthemum inapertum Willd. Côteaux et champs incultes : autour de Briançon, vallée de Cervières, etc. 13-1500 m. Fl. 6-7.

Synanthérées.

Hypochœris maculata L. Prairies : Lautaret, Gondran, Saint-Véran, col de Vars, etc. 2000-2300 m. Fl. 7-8.

— *uniflora Vill.* Prairies : Lautaret, Mont-Viso, vallon Agnel, col de Vars, etc. 2000-2200 m. Fl. 7-8.

Leontodon taraxaci L. Rocailles : Galibier, Echauda, Prorel, cols Isoard et des Ayes, Mont-Viso, etc. 2500 m. Fl. 7-8.

— *pyrenœus Gouan.* Prairies : Lautaret, Mont-Viso Saint-Véran à Clausis, etc. 2000-2200 m. Fl. 7.

— *alpinus Vill.* Prairies: Lautaret, Mont-Genèvre, Mont-Viso, etc. 2000 m. Fl. 7-8.

— *crispus Vill.* Côteaux secs : Briançon, Val-des-Prés, etc. 14-1500 m. Fl. 6-7.

Picris crepoides Saut. Prairies : Lautaret. 2000 m. Fl. 7-8.

— *pyrenaica* L. Prairies : Lautaret, Lauzet, Névache, Mont-Viso, etc. 1600-2000 m. Fl. 6-7.

Scorzonera austriaca Willd. Rochers, côteaux : Lautaret, Plampinet, Briançon, etc. 13-2000 m. Fl. 6-7.

— *hispanica* L. Prairies : col de Vars. 2100 m. Fl. 7.

— *glastifolia Wallr.* Prairies : Puy-Saint-Pierre près Briançon. 1500 m. Fl. 6-7.

Podospermum laciniatum DC. Côteaux, bords des chemins : Briançon, Lavachette, etc. 13-1400 m. Fl. 6-8.

— *decumbens GG.* Bords des champs : La Grave, Névache, Abriès, Guillestre, etc. 10-1700 m. Fl. 6-7.

Digitized by Google

Tragopogon crocifolius L. Lieux secs : Monêtier, Briançon, etc. 13-1500 m. Fl. 6-7.

— *dubius Vill.* Côteaux : Monêtier, Briançon, etc. 13-1500 m. Fl. 6-7.

Taraxacum erythrospermum Andrz. Bords des chemins : Monêtier, Briançon, Cervières, etc. 13-1500 m. Fl. 5-6. (C'est la seule espèce de Taraxacum qui ait le fruit rouge.)

Lactuca chondrillæflora Bor. Côteaux pierreux : Briançon, vallée de Cervières. 13-1400 m. Fl. 8-9.

— *perennis* L. Côteaux : Monêtier, Briançon, Cervières, etc. 13-1600 m. Fl. 5-6.

Prenanthes purpurea L. Bois frais : Lautaret, Névache, Lavachette, Cervières, etc. 14-2000 m. Fl. 6-8.

Mulgedium alpinum L. Bois : Lautaret à la Madeleine. 1800 m. Fl. 7-8.

Crepis albida Vill. Rochers, côteaux : Lautaret, Névache, Mont-Genèvre, Puy-Saint-André, Briançon, etc. 1300-2000 m. Fl. 8.

— *aurea Cass.* Prairies : Lautaret, Galibier, les Thures sur Névache, Buffère et Laval, Montgenèvre, Cervières, Mont-Viso, etc. 18-2200 m. Fl. 6-7.

— *pygmœa* L. Rocailles : Galibier, Infernet sur Briançon, les Ayes, Mont-Viso, etc. 2300-2600 m. Fl. 7-8.

— *pulchra* L. Champs : Monêtier, Vallouise. 1200-1600 m. Fl. 5-6.

— *blattarioides* L. Prairies ; Lautaret, Monêtier, col de Vars, etc. 16-2000 m. Fl. 6-7.

— *grandiflora Tausch.* Prairies : Lautaret, Gondran, Mont-Viso, col de Vars, etc. 2-2200 m. Fl. 7-8.

Soyeria montana Monn. Prairies : Lautaret, Gondran, Saint-Véran à Clausis, col de Vars, etc. 2200-2200 m. Fl. 7-8.

— *paludosa Mœnch.* Lieux humides, tourbeux : Lautaret, Gondran, Saint-Véran, col de Vars, etc. 2000-2200 m. Fl. 6-7.

Hieracium velutinum Heg. et Hcer. Bois, prairies : Lautaret, l'Echelle, Mont-Viso, col de Vars, etc. 1700-2300 m. Fl. 6-8.

Digitized by Google

Hieracium aurantiacum L. Prairies, rochers : Lautaret, Buffère sur Névache, col des Ayes sur Brunissard, Mont-Viso, vallon Agnel, etc. 2000-2200 m. Fl. 6-8.

— *prealtum Vill.* Broussailles, côteaux : Lavachette au bas du bois des Bancs, Briançon sous le fort des Trois-têtes, etc. 13-1400 m. Fl. 7.

— *cymosum* L. Prairies : Lautaret, Malrif, Queyras, etc. 2000-2500 m. Fl. 7.

— *florentinum All.* Graviers : de Val-des-Prés à Plampinet, Lavachette, Briançon, vallée de Cervières, etc. 13-1600 m. Fl. 7-8.

— *glaciale Lochn.* Prairies : Lautaret, les Ayes et Côterousse sur Villard-Saint-Pancrace, Mont-Viso, Saint-Véran, col de Vars, etc. 2000-2400 m. Fl. 7-8.

— *sabinum Seb et M.* Prairies : Lautaret, Mont Viso, col de Vars, etc. 2000-2200 m. Fl. 7.

— *staticœfolium Vill.* Lieux pierreux, graviers : abonde partout. 13-1800 m. Fl. 7-8.

— *Brigantiacum Jord.* Rochers : Monêtier à gauche et au bas du Tabut. 1600 m. Fl. 7.

— *glaucum All.* Côteaux, bois : Lautaret, plateau de l'Echelle, les Bauches près Plampinet, Lavachette, Cervières au Bois-de-Ville et dans les Oules, col Isoard, etc. 1400-2400 m. Fl. 7-8.

— *glaucopsis GG.* Rochers : Villar-d'Arène, Monêtier, Montgenèvre, etc. 15-1900 m. Fl. 7.

— *politum Fries.* Rochers : de Briançon à Lavachette, vallée de Cervières. 14-1700 m. Fl. 7.

— *subnivale GG.* Côteaux pierreux : cols Péas et d'Isoard et vallon des Oules sur Cervières, col des Ayes sur Queyras, Mont-Viso, etc. 2300-2500 m. Fl. 8.

— *jugicolum Jord.* Côteaux pierreux : plâteau de l'Echelle, vallon des Oules, Roche-Moutte sur Villard-St-Pancrace, col de Vars, etc. 1800-2500 m. Fl. 8.

— *glanduliferum Hoppe.* Pelouses : Lautaret, Galibier Gondran, col des Ayes, Mont-Viso, col de Vars, etc. 2000-2300 m. Fl. 7-8.

Digitized by Google

Hieracium piliferum Hoppe. Rochers : Lautaret, Galibier, Rochilles sur Névache, col Malrif, Roche-Moutte sur Villard-Saint-Pancrace, col de Vars, etc. 2000-2300 m. Fl. 7-8

— *villosum* L. Rochers : Lautaret, Péas, Mont-Viso, col de Vars, etc. 2000-2500 m. Fl. 7-8.

— *scorzonerœfolium Vill.* Prairies: Lautaret, Echauda, vallée de Cervières, les Oules, Mont-Viso, col de Vars etc. 16-2400 m. Fl. 7-8.

— *saxatile Vill.* Rochers : Briançon, Lavachette, Mont-Genèvre, Cervières, etc. 13-1800 m. Fl. 7.

— *alpinum* L. Rochers : Névache aux Rochilles, Mont-Viso, St-Véran à Clausis. 2300 m. Fl. 7.

— *pseudo-cerinthe Koch.* Rochers : Lautaret, Mont-Genèvre, Col de Vars, etc. 1500-2000 m. Fl. 7-8.

— *amplexicaule* L. Rochers : Lautaret, Monêtier, Briançon, Cervières, Saint-Véran à Marcel, etc. 14-2400 m. Fl. 7-8.

— *pulmonarioides Vill.* Rochers : La Grave, Villard-d'Arènes. 1600 m. Fl. 7.

— *lanatum Vill.* Rochers, côteaux : Lautaret, Briançon, Montgenèvre, Lavachette, Cervières, Malrif, Mont-Viso, etc. 1300-2000 m. Fl. 7-8.

— *œnochroum Jord.* Rochers, côteaux : sous l'Infernet à Briançon, vallon des Ayes entre les chalets. 2000 m. Fl. 7-8.

— *andryaloides Vill.* Rochers, côteaux : Briançon sous les forts, Mont-Viso, col Agnel. 13-2000 m. Fl. 7-8.

— *pulchellum Jord.* Côteaux : Névache, Roche-Moutte sur Villard-Saint-Pancrace, etc. 1700-2000 m. Fl. 7-8.

— *farinulentum Jord.* Rochers, côteaux : Montgenèvre, Briançon, etc. 13-1800 m. Fl. 6-7.

— *rupestre All.* Rochers : Cervières, Guillestre. 1000-1600 m. Fl. 7-8.

— *chloropsis GG.* Rochers : Lautaret, Lauzet, Névache à l'Altarocho, Lavachette. 14-2000 m. Fl. 7.

Digitized by Google

Hieracium Jacquini Vill. Rochers : La Grave, Névache, Plampinet, Briançon, Cervières, etc. 13-1700 m. Fl. 7.

— *ochroleucum Schl.* Prairies : Lautaret, Gondran, Mont-Viso, col de Vars, etc. 2000-2200 m. Fl. 7-8.

— *cydonicefolium Vill.* Bois : Lautaret, Rochilles, col de Vars, etc. 2000 m. Fl. 7-8.

— *valdepilosum Vill.* Prairies : Villar-d'Arène, Arcines, Lautaret, col de Vars, etc. 1700-2100 m. Fl. 7-8.

— *prenanthoides Vill.* Bois et prairies : La Grave, Saint-Véran, col de Vars, etc. 16-2000 m. Fl. 7-8.

— *elatum Fries.* Prairies : Lautaret, col de Vars, etc. 2000 m. Fl. 7-8.

— *f amphili Arv. T.* Bords des torrents: Lautaret. 2100 m. Fl. 7-8.

— *depauperatum Jord.* Bois de pins : Briançon à la Pinée et à Pramorel. 1400 m. Fl. 9.

— *œstivum GG.* Prairies : Lautaret à Prime-Messe. 1900 m. Fl. 8.

(Malgré le grand nombre d'hieracium que j'ai cités, je dois dire que la liste des formes *intéressantes* de ce genre est encore bien incomplète.)

Campanulacées.

Phyteuma pauciflorum L. Rochers: Lautaret, Galibier, Cervières à Terre-Nière, col Malrif, Mont-Viso, col Agnel et Blanchet, etc. 2200-2700 m. Fl. 7-8.

— *hemisphœricum* L. Rochers, pelouses : Lautaret, Buffère, col des Ayes sur le versant du Villard, Mont-Viso, etc. 2000-2500 m. Fl. 8.

— *Charmelii Vill.* Rochers de Lavachette à Montgenèvre en suivant le ruisseau, Château-Queyras. 13-1600 m. Fl. 6.

— *betonicœfolium Vill.* Prairies, bois : Lautaret, Monêtier, Buffère, col des Ayes sur Queyras, Mont-Viso, col de Vars, etc. 2000-2200 m. Fl. 7-8.

Digitized by Google

Phyteuma scorzonerœfolium Vill. Pelouses : Lautaret Galibier, Echauda, Buffère, Mont-Genèvre, les Oules sur Cervières, etc. 2000-2400 m. Fl. 7-8.

— *Halleri All.* Prairies, bois : Lautaret, Mont-Viso' col Agnel, col de Vars, etc. 2000-2200 m. Fl. 7-8.

— *Halleri var. cœrulescens Bonnet.* Bois : Cervières au bois de Ville, les Ayes. 1900 m. Fl. 7.

(Découverte par moi, le 13 juillet 1881.)

Campanula barbata L. Prairies : Lautaret, Gondran, Saint-Véran, col de Vars, etc. 2000-2200 m. Fl. 6-7.

— *Allionii Vill.* Côteaux rocailleux : Galibier, Infernet de Briançon, cols Malrif. d'Isoard et des Ayes, Mont-Viso, Saint-Véran, col de Vars, etc. 2200-2500 m. Fl. 7-8.

— *spicata* L. Côteaux, rochers : Lautaret, Plampinet, Granon, Briançon aux Salettes, Mont-Viso, etc. 1400-2000 m. Fl. 6.

— *thyrsoidea Schm.* Prairies : Lautaret, Mont-Viso. 2000 m. Fl. 6-7.

— *urticœfolia Schm.* Broussailles : Névache à la 1re cascade. 1800 m. Fl. 7.

— *rhomboidalis* L. Prairies : Lautaret, Monêtier, Lavachette, Mont-Genèvre, Mont-Viso, etc. 1400-2000 m. Fl. 6-7.

— *cæspitosa Scop.* Ravines : de Lavachette à Mont-Genèvre par le bois des Bancs. 1500 m. Fl. 7.

— *pusilla Hœnke.* Rochers : Lautaret, Monêtier, Queyras, etc. 16-2000 m. Fl. 7-8.

— *rotundifolia* L. Rochers : Mont-Genèvre, Cervières, Mont-Viso, etc. 1600-2000 m. Fl. 7-8.

— *Mathonneti Jord.* Rochers : col de l'Echelle. 1700 m. Fl. 7.

— *gracilis Jord.* Rochers : sous le fort des Trois-Têtes à Briançon. 1350 m. Fl. 5.

— *Cenisia* L. Rochers : Galibier, Cervières à Terro-Nière, Malrif, etc. 2500-3000 m. Fl. 8.

Digitized by Google

Vacciniées.

Vaccinium myrtillus L. Bois : un peu partout, surtout à l'exposition Nord. 1800-2200 m. Fl. 6.

— *uliginosum* L. Lieux tourbeux : Lautaret, Gondran, Mont-Viso, Saint-Véran à Clausis, col de Vars, etc. 2000 m. Fl. 6.

— *vitis-idœa* L. Bois : Arcines, Monêtier, Queyras, etc. 1600 m. Fl. 6.

Ericinées.

Arctostaphylos alpina Spreng. Rocailles : Lautaret. 2000 m. Fl. 5-6.

— *officinalis Wimm.* Bois : Arcines, Lautaret, Plampinet, Lavachette, Briançon, etc. 1300-2000 m. Fl. 6.

Loiseleuria procumbens Desv. Rochers : Villar-d'Arène sous les glaciers du Bec, Malrif, col de Vars, etc. 2500-3000 m. Fl. 7.

Rhododendron ferrugineum L. Bois ; pâturages : pentes regardant le Nord. 2000-2500 m. Fl. 6-7.

Pyrolacées.

Pyrola minor L. Bois : Névache au Queyrelin et à la combe des Thures. 2000 m. Fl. 5-6.

— *chlorantha Sw.* Bois : Lavachette sur la route du Vallon, Mont-Genèvre. 14-1600 m. Fl. 6-7.

— *secunda* L. Bois : Buffère sur Névache, Lavachette 1400-2000 m. Fl. 6-7.

— *uniflora* L. Bois : Mont-Genèvre, Lavachette sur les pentes de l'Infernet, Cervières au bois de ville et à Isoard, Saint-Véran, etc. 14-2000 m. Fl. 6-7.

Monotropées.

Monotropa hypopithys L. Parasite sur les Mélèzes : Bois du Grand-Villard. 1800 m. Fl. 7.

Digitized by Google

Lentibulariées.

Pinguicula grandiflora Lam. Lieux humides : Lavachette, Montgenèvre. 14-1600 m. Fl. 5-6.

— *alpina* L. Lieux tourbeux : Arcines, Lautaret, Mont-Genèvre, Gondran, Cervières vers Piméan, Queyras, col de Vars, etc. 16-2000 m. Fl. 7.

Primulacées.

Primula officinalis Jacq. Bois : Monêtier, Briançon. Montgenèvre, etc. 13-1900 m. Fl. 4-5.

— *intricata* G.G. Prairies : Montgenèvre, col de Vars 1900-2200 m. Fl. 6.

— *farinosa* L Prairies humides : partout 1200-2500 m. Fl. 4-7.

— *longiflora All.* Prairies séches : Saint-Véran à la Grangeasse et autres endroits, vallon Agnel et vallée de Vars. 2000 m. Fl. 6.

— *marginata Curt.* Rochers : Queyras le long du Guil, col Agnel, Saint-Véran à Roche-Ronde, etc. 1400-2300 m. Fl. 5-6.

— *viscosa Vill.* Rochers : Lautaret à Pra-Brunet, Monêtier, Mont-Viso. 17-2000 m. Fl. 6.

— *latifolia Lap.* (fleurs violettes.) Rochers : Arcines, Lautaret, Névache, Montgenèvre aux Replattes. 1700-2200 m. Fl. 6.

— *latifolia Lap.* (fleurs blanches.) Rochers : Mont-Genèvre aux Replattes. 2200 m. Fl. 6.

Gregoria Vitaliana Duby. Côteaux : Arcines, Lautaret, Galibier, Gondran ; cols Malrif, Isoard et des Ayes, Mont-Viso, Saint-Véran, col de Vars, etc. 2000-2500 m. Fl. 5-6.

Androsace helvetica Gaud. Rochers : Villar d'Arêne, Cervières à Terre-Nièro, Mont-Viso. 3000 m. Fl. 7.

— *pubescens* DC. Rocailles : Galibier, Névache aux Muandes, Mont-Genèvre, Mont-Viso, col Agnel, etc. 2500 m. Fl. 7-8.

Digitized by Google

Androsace villosa L. Pelouses : entre l'Echelle et les Thures, Mont-Viso à la Traversette. 2200 m. Fl. 6-7.

— *imbricata Lam.* Rochers : Lautaret, Mont-Viso à la Traversette et à Ruine. 2200 m. Fl. 6-7.

— *lactea* L. Rochers : Lautaret, la Ponsonnière. 2500 m. Fl. 7.

— *brigantiaca Jord.* Pelouses, bois : Lautaret, Gondran, Saint-Véran, etc. 18-2000 m. Fl. 5-6.

— *obtusifolia All.* Pelouses : Arcines, Lautaret à Pra-Brunet, Montgenèvre, cols d'Isoard et des Ayes, Queyras, etc. 1900-2300 m. Fl. 6-8.

— *septentrionalis* L. Côteaux, prairies : Lautaret, Névache à l'Altarocho, Briançon dans le fort des Trois-Têtes et autour de ce fort, Villard Saint-Pancrace, Mont-Viso, col Agnel, etc. 1300-2000 m. Fl. 5-6.

— *maxima* L. Champs : Briançon, Monêtier, Lavachette, etc. 13-1500 m. Fl. 4.

— *Chaixi* G.G. Pelouses : bastion d'Asfeld à Briançon. 1400 m. Fl. 5-6.

Soldanella alpina L. Prairies à la fonte des neiges : Arcines, Lautaret, Rochilles, Mont-Genèvre, Gondran, Saint-Véran, col de Vars, etc. 1900-2200 m. Fl. 4-5.

Asclépiadées.

Vincetoxicum laxum G.G. Bords des routes : de Val-des' prés à Plampinet. Monêtier, etc. 1500 m. Fl. 7.

Gentianacées.

Gentiana lutea L. Prairies : Lautaret, Mont-Genèvre, les Ayes, Saint-Véran, col de Vars; etc. 19-2100 m. Fl. 7-8.

— *luteo-punctata* G.G. Prairies-bois : Montgenèvre, les Ayes. 1900-2000 m. Fl. 7-8.

— *Burseri Lap.* Prairies : Mont-Viso, col de Vars. 2000-2200 m. Fl. 7-8.

Digitized by Google

Gentiana punctata L. Prairies : Arcines, Lautaret, Mont-Genèvre, Mont-Viso, etc. 1900-2100 m. Fl. 6-7.

— *asclepiadea* L. Lieux humides : Lautaret, Echauda en Vallouise, col de Vars, etc. 2000 m. Fl. 7-8.

— *latifolia* G.G. Bois, prairies : Arcines, Lauzet, Monêtier, Mont-Genèvre, Gondran, Saint-Véran, col de Vars, etc. 1600-2200 m. Fl. 5-6.

— *alpina Vill.* Pelouses : La Grave, Villar d'Arène, Gondran aux Tempétières. 2200 m. Fl. 8.

— *bavarica* L. Lieux humides : Lautaret, Galibier, Laval près Névache. 2000-2300 m. Fl. 7-8.

— *Rostani Reuter.* Lieux humides : Gondran, col Agnel, col de Vars, etc. 2000-2200 m. Fl. 7.

— *verna* L. Prairies : un peu partout, sous diverses formes : *pumila*, *elongata*, *alata*, etc. 1400-2500 m. Fl. 5-8.

— *brachyphylla Vill.* Pelouses : Arcines, Galibier, Gondran, cols d'Isoard et des Ayes, Mont-Viso, Saint-Véran à Clausis, col de Vars, etc. 2200-2500 m. Fl. 7-8.

— *glacialis Vill.* Lieux humides : Lautaret, Galibier, vallon des Ayes sur Briançon, Mont-Viso, Saint-Véran à Clausis, col de Vars, etc. 2200-2500 m. Fl. 7-8.

— *nivalis* L. Pelouses : Lautaret, Galibier, Gondran, sur Cervières, Rochilles et plateau des Thures sur Névache, col des Ayes sur Queyras, col de Vars, etc. 2000-2300 m. Fl. 7-8.

— *ciliata* L. Bords des bois : Monêtier, Plampinet Cervières, etc. 16-1900 m. Fl. 8.

Swertia perennis L. Lieux tourbeux : Arcines, Lautaret, Gondran, Mont-Viso, Saint-Véran vers Clausis, col de Vars, etc. 2000-2300 m. Fl. 7-8.

Menyanthes trifoliata L. Etangs : Gondran sur le versant de Cervières. 2000 m. Fl. 5-6.

Digitized by Google

Borraginées.

Cerinthe minor L. Prairies : Lautaret, Briançon, Mont Genèvre, Mont-Viso, etc. 1300-2000 m. Fl. 6-7.

— *alpina Kit.* Prairies : Mont-Viso, 2000-2200 m. Fl. 7.

Anchusa augustifolia Vill. Bords des routes : abondante autour de Briançon. 13-1400 m. Fl. 6-7.

Myosotis alpestris Schmidt. Pelouses : Arcines, Galibier, Gondran, les Oules, Saint-Véran, etc. 1800-2500 m. Fl. 7-8.

Erytrichium nanum Schrad. Rochers : Lautaret sur le Haut-Richard, Combeynot près le Lauzet, Mont-Viso. 2500-3000 m. Fl. 7-8.

Cynoglossum Dioscoridis Vill. Côteaux : Briançon au Fontenil, Puy Saint-Pierre, etc. 13-1600 m. Fl. 6-7.

Asperugo procumbens L. Décombres, vieux murs : Briançon, Monêtier, Lavachette, Cervières, etc. etc. 13-1800 m. Fl. 5-7.

Solanées.

Solanum dulcamara L. Bords des routes, vieux murs : Monêtier, Briançon, Val-des-Prés, Cervières, etc. 13-1700 m. Fl. 6-7.

Scrophulariacées.

Scrophularia Hoppii Koch. Graviers : Arcines, Rochilles sur Névache, Mont-Genèvre, etc. 1800-2200 m. Fl. 6-7.

Antirrhinum latifolium DC. Rochers : Briançon vers la croix de Toulouse. 1500 m. Fl. 6.

Linaria Italica Trév. Côteaux : Lautaret, Monêtier à Puy-Géomard, les Eduits et le Poët, près Briançon, Cervières, etc. 1800 m. Fl. 7-8.

— *alpina* DC. Lieux pierreux : Arcines, Galibier, Rochilles, Gondran, Vallouise, Saint-Véran, etc. 2200 m. Fl. 6-7.

Digitized by Google

Veronica urticæfolia L. Bois frais : La Grave aux Fréaux, Lavachette dans la Molle et dans le bois des Bancs. etc. 14-1800 m. Fl. 7.

— *aphylla* L. Lieux pierreux : Arcines, Lautaret, Galibier, Cervières à Isoard, col des Ayes, Mont-Viso, Saint-Véran, etc. 2000-2300 m. Fl. 6-7.

— *Allioni Vill.* Bois, pelouses : Lautaret, Galibier, Gondran, col Isoard et des Ayes, Mont-Viso, col de Vars, etc. 1900-2300 m. Fl. 7-8.

(C'est cette espèce que l'on récolte en quantité pour être vendue aux herboristes.)

— *officinalis* L. Bois de mélèzes : Villard Saint-Pancrace avec le précédent, mais plus rare ; Saint-Véran et Fontgillarde. 1800-2000 m. Fl. 8.

— *fruticulosa* DC. Rochers : Lautaret, Galibier, Valdes-Prés à la Crépio, Névache; etc. 2000 m. Fl. 7-8.

— *saxatilis Jacq.* Rochers : Arcines, Névache, Mont-Viso, Saint-Véran à Serennes, etc. 2000-2200 m. Fl. 6-7.

— *bellidioides* L. Pelouses : Arcines, Lautaret à Pra-Brunet, Galibier, la Ponsonnière, Cervières à Venton, Mont-Viso, cols Agnel et Vieux, Saint-Véran à Longet, col de Vars, etc. 1900-2500 m. Fl. 6-8.

— *alpina* L. Rochers, pelouses : Lautaret, Galibier, Cervières à Pra-Fauchier, Mont-Viso, Saint-Véran à Blanchet, col de Vars, etc. 2200-2500 m. Fl. 6-7.

— *serpyllifolia* L. Prairies humides : Monêtier, Plampinet, Lavachette, Briançon, etc. 13-1600 m. Fl. 6.

— *tenella All.* Lieux humides : Lautaret, Gondran, col de Vars, etc. 2000-2200 m. Fl. 7-9.

Digitalis parviflora All. Lieux pierreux : Monêtier sur le sentier du Puy-Géomard. 1700 m. Fl. 7-8.

— *grandiflora All.* Lieux pierreux : Lautaret sur le versant du Villar-d'Arène. 1900 m. Fl. 7-8.

Euphrasia alpina L. Pelouses : Montgenèvre, Isoard, les Ayes, etc. 1900-2200 m. Fl. 7-8.

— *minima Jacq.* Pelouses : Lautaret, Cervières à Pra-Fouchier, les Ayes, Mont-Viso, etc. 2000 m. Fl. 7-8.

Digitized by Google

Odontites Brigantiaca Jord. Bois de pins : rampes du Montgenèvre, Briançon. 1300-1800 m. Fl. 8.

— *lanceolata Rchb.* Moissons : Névache, Monêtier, Cervières, etc. 15-1700 m. Fl. 7.

Bartsia alpina L. Lieux humides : Arcines, Lautaret, Névache, Gondran, Mont-Viso, Saint-Véran à Clausis, col de Vars, etc. 18-2300 m. Fl. 6-7.

Pedicularis verticillata L. Prairies humides : Arcines, Lautaret, Monêtier, Val-des-Prés, Mont-Genèvre, Gondran, Mont-Viso, Saint-Véran, col de Vars, etc. 1400-2200 m. Fl. 6-7.

— *foliosa* L. Prairies, bois : Lautaret, Mont-Genèvre, Gondran, Puy Saint-Vincent en Vallouise, Saint-Véran, col de Vars, etc. 1800-2200 m. Fl. 6-7.

— *rosea Wulf.* Rochers : Buffère, Granon ; Terre-Nièro, col Péas et les Oules sur Cervières, Mont-Viso, Saint-Véran, etc. 2300 m. Fl. 8.

— *comosa* L. Prairies : Arcines, Lautaret, Lauzet, Monêtier, Névache, Briançon. Gondran, col des Ayes, Saint-Véran, col de Vars, etc. 1300-2200 m. Fl. 5-6.

— *incarnata Jacq.* Prairies : Arcines, Lautaret, Buffère, Montgenèvre à Gondran, Mont-Viso, Saint-Véran à Blanchet, col de Vars, etc. 2000-2300 m. Fl. 6.

— *cenisia Gaud.* Prairies : Lautaret, Galibier, Névache dans le Chardonnet et à Fontcouvert, Mont-Genèvre au bas de Gondran, etc. 2000-2300 m. Fl. 7.

— *fasciculata Bell.* Pelouses : Lautaret, Mont-Genèvre, vallon Agnel, Saint-Véran aux Serennes, col de Vars, etc. 2000 m. Fl. 7-8.

— *rostrata* L. Pelouses : Buffère sur Névache ; Terro-Niero, Venton et Péas sur Cervières, Mont-Viso, etc. 2100-2400 m. Fl. 7-8.

— *tuberosa* L. Prairies : Lautaret, Galibier, N.D. de Prorel, Mont-Viso à la Taillante, etc. 2000-2500 m. Fl. 7.

— *Barrelieri Rchb.* Rochers : du Lautaret au Galibier. 2200 m. Fl. 7.

Digitized by Google

Melampyrum sylvaticum L. Bois : Monêtier, Plampinet, Mont-Genèvre, Cervières au Bois-de-Ville, etc. 15-1800 m. Fl. 7.

Orobanchées.

Phelipœa cœrulea C.A.M. Sur l'*Achillea millefolium :* Abriès, vallon Agnel. 1500-2200 m. Fl. 7.

Orobanche scabiosæ Koch. Sur *Scabiosa columbaria,* etc : La Grave, Villar d'Arène, Lautaret, Abriès. 1700-2000 m. Fl. 7-8.

— *artemisiæ Vauch.* Sur *Artemisia campestris* : Lautaret, vallée de Cervières. 15-1900 m. Fl. 7.

Labiées.

Lavandula vera DC. Côteaux secs : Briançon, Plampinet, Mont-Genèvre, Cervières, etc. 13-1800 m. Fl. 7-8.

— *delphinensis Jord.* Broussailles, haies : vallée de Cervières. 1400 m. Fl. 7-8.

Mentha sylvestris L. Bords des ruisseaux : Val-després, Briançon, Fontchristiane, Villard Saint-Pancrace, etc. 13-1500 m, Fl. 7-8.

— *viridis* L. Bords des canaux : Monêtier, Briançon. 13-1500 m. Fl. 8.

Thymus pannonicus Fries. Bois : de Plampinet à l'Echelle. 1700 m. Fl. 7-8.

Hyssopus decumbens Jord. Côteaux secs, rocailleux : Névache à l'Altorocho, vallée de Cervières. 1400-1700 m. Fl. 8.

— *montanus Jord.* Côteaux gazonnés : entre les forts de Briançon, bords de la route de Cervières, bas des rampes du Mont-Genèvre. 1400 m. Fl. 7-8.

Satureia montana L. Rochers : Guillestre, Château-Queyras. 1000-1300 m. Fl. 7-8.

Calamintha grandiflora Mœnch. Bois pierreux : Lautaret à la Madeleine, Monêtier, Briançon, etc. 13-1900 m. Fl. 7-8.

Digitized by Google

Calamintha nepetoides Jord. Lieux pierreux : la Grave, autour du fort des Trois-Têtes, vallée de Cervières, etc. 13-1500 m. Fl. 8-9.

— *alpina Lam.* Côteaux, pâturages : Arcines, Lautaret, Montgenèvre, Saint-Véran à Serennes, col de Vars. etc. 1800-2200 m. Fl. 5-6.

Salvia æthiopis L. Côteaux : Briançon sur la route d'Italie, etc. 1300 m. Fl. 6-7.

Nepeta lanceolata Lam. Bords des routes : Briançon, Val-des-prés, Cervières, Queyras, etc. 13-1500 m. Fl. 7.

Dracocephalum Ruyschiana L. Prairies pierreuses : Lautaret sur Villar d'Arène. 1900 m. Fl. 7.

Galeopsis monticola Iord. Champs après la moisson : Monêtier, Briançon, vallée de Cervières, etc. 13-1500 m. Fl. 9.

Stachys alpina L. Bois : Lautaret à la Madeleine. 1800 m. Fl. 7-8.

Betonica alopecuros L. Prairies : Lautaret, 2000 m. Fl. 7-8.

— *hirsuta* L. Prairies : Lautaret, Gondran, Mont-Viso, col de Vars, etc. 2000 m. Fl. 7-8.

Scutellaria alpina L. Côteaux : Lautaret, Mont-Genèvre, vallée de Cervières, col Isoard, Mont-Viso, Saint-Véran, etc. 1400-2000 m. Fl. 6-7.

Ajuga pyramidalis L. Bois : Arcines, Mont-Genèvre, Cervières, Saint-Véran, etc. etc. 1800-2000 m. Fl. 6.

Teucrium chamœdrys L. Côteaux, bois pierreux : Monêtier, Lavachette, Briançon, vallée de Cervières, etc. 1300-1700 m. Fl. 6-7.

— *montanum* L. Côteaux : Monêtier, Briançon, Mont-Genèvre, Cervières, col Isoard et des Ayes, etc. etc. 1300-2000 m. Fl. 7-8.

Plantaginées.

Plantago Brutia Ten. Prairies : Villar d'Arène, Lautaret. Mont-Genèvre. 17-1900 m. Fl. 6-7.

Digitized by Google

Plantago alpina L. Pelouses : Arcines, Lautaret à Pra-Brunet, Lauzet, Gondran, Saint-Véran à Clausis, etc. 1700-2200 m. Fl. 6-7.

— *fuscescens Jord.* Prairies : Mont-Viso, vallon Agnel, 2200 m. Fl. 7.

— *cynops* L. Côteaux : Monêtier, Névache, Briançon, Mont-Viso, etc. 13-1900 m. Fl. 5-6.

Plumbaginés.

Armeria alpina Willd. Pelouses : Lautaret, Galibier, Terro-Nièro et Venton sur Cervières, col des Ayes, Mont-Viso, vallon Agnel, Saint-Véran, etc. 2-3000 m. Fl. 7-8.,

— *præcox Jord.* Côteaux, rochers : Lauzet, Névache à l'Altarocho, Mont-Genèvre, col des Ayes, etc. 1700-2300 m. Fl. 7-8.

Globulariées.

Globularia cordifolia L. Rochers : Lautaret, Monêtier, Névache, Mont-Genèvre, Cervières, etc. 1500-2200 m. Fl. 5-7.

Salsolacées.

Atriplex microtheca Moq. Tand. Décombres : autour de la ville de Briançon. 1300 m. Fr. 9.

— *laciniatus* L. Décombres : Briançon depuis la manutention jusqu'au delà du pont de communication. 1300 m. Fr. 10.

Polygonées.

Oxyria digyna Campd. Lieux pierreux : Lautaret, col des Ayes, Mont-Viso, Saint-Véran à Clausis, etc. 2000-2500 m. Fr. 3-9.

Rumex alpinus L. Prairies avoisinant les chalets : Lautaret, Névache à Laval, Cervières, col de Vars, etc. 1700-2200 m. Fr. 8.

— *arifolius All.* Pelouses : Névache aux Rochilles. 2200 m. Fr. 8-9.

Digitized by Google

Polygonum bistorta L. Prairies : à peu près partout. 1400-2000 m. Fl. 6-7.

— *viviparum* L. Pelouses : Buffère, Infernet, Gondran, Cervières, Saint-Véran, etc. 2000 m. Fl. 7.

— *alpinum All.* Lieux pierreux : Mont-Viso à la Taillante entre les deux lacs, vallon Agnel, Saint-Véran au delà de Clausis. 2400 m. Fl. 7-8.

Daphnoïdées.

Daphne mezereum L. Bois pierreux : Arcines, Montgenèvre, Saint-Véran, etc. 1600-2200 m. Fl. 5-6.

— *alpina* L. Côteaux pierreux : Briançon, Lavachette, etc. 13-1400 m. Fl. 5.

— *striata Tratt.* Lautaret, à Pra-Brunet vers la Guisanne et en face du ruisseau blanc. 1900 m. Fl. 6.

— *cneorum* L. Côteaux bois : Briançon, Névache, Plampinet, Mont-Genèvre à Sestrières, Cervières à Piméan, les Ayes sur Brunissard, etc. 1300-2300 m. Fl.6-8.

Santalacées.

Thesium alpinum L. Pelouses : Lautaret, Névache aux Rochilles, Saint-Véran, etc. 2000 m. Fl. 6.

— *pratense Ehrh.* Prairies : Lautaret, Monêtier, Lavachette, etc. 1400-2000 m. Fl. 6-7.

Eléagnées.

Hippophae rhamnoïdes L. Bords des cours d'eau : partout 13-1600 m. Fl. 4 ; Fr. 8-9.

Empétrées.

Empetrum nigrum L. Lieux tourbeux : Lautaret, Gondran aux sources de la Durance, les Ayes, 2000-2200 m. Fr. 8.

Digitized by Google

Euphorbiacées.

Euphorbia helioscopia L. Lieux cultivés : Monêtier, Briançon, etc. 13-1500 m. Fl. 5-9.

— *dulcis* L. Bois: Monêtier, Mont-Genèvre. Saint-Véran, etc. 14-1900 m. Fl. 5.

— *cyparissias* L. Côteaux, bois : Briançon, Monêtier, Mont-Genèvre, Saint-Véran, etc. 1300-2000 m. Fl. 4-5.

— *verrucosa Lam.* Côteaux : Briançon. 1300 m. Fl. 6.

Urticées.

Urtica urens Lin. Décombres, rues des villages : Briançon, Névache, Mont-Genèvre, Cervières, etc. 13-1800 m. Fl. 5-9.

- *dioica* L. Bords des routes, décombres : Briançon, Monêtier, Cervières, etc. 13-1700 m. Fl. 6-9.

Salicinées.

Salix pentandra L. Lieux humides : Villar d'Arêne, Mont-Viso, col de Vars, etc. 18-2000 m. Fl. 5-6.

— *incana Schr.* Sables de rivières : Monêtier, Briançon, Val-des-Prés, etc. 13-1500 m. Fl. 4-5.

— *Daphnoides Vill.* Bords des routes et des canaux : Monêtier, Névache, Briançon, etc. 12-1700 m. Fl. 4-5.

— *grandifolia Ser.* Côteaux, bois : la Madeleine près le Lautaret, 1900 m. Fl. 5-6.

— *hastata* L. Bois : Lautaret à la Madeleine, Monêtier, Névache vers le Chardonnet, Gondran, Saint-Véran à Clausis, etc. 1600-2200 m. Fl. 6-7.

— *nigricans Smith.* Bords des chemins, lieux humides: Monêtier, Briançon, Vars, etc. 13-1600 m. Fl. 6-7.

— *cæsia Vill.* Lieux tourbeux : Lautaret, Mont-Viso, col de Vars, etc. 2000-2200 m. Fl. 7-8.

— *sericea Vill.* Lieux frais : Monêtier, Buffère, Gondran, Mont-Viso, col de Vars, etc. 16-2000 m. Fl. 6.

Digitized by Google

Salix arbuscula L. Lieux humides : Lautaret, Monêtier, Gondran, Mont-Viso, etc. 1600-2000 m. Fl. 6.

— *myrsinites* L. Bords des ruisseaux : Lautaret, Névache, Mont-Viso, cols Agnel, Vieux et de Vars, etc. 2000-2200 m. Fl. 6.

— *reticulata* L. Côteaux, rochers : Arcines, Galibier, col Isoard, Mont-Viso, Saint-Véran à Clausis, etc. 2000-2300 m. Fl. 6-7.

— *retusa* L. Pelouses : Arcines, Lautaret, Galibier, Cervières à Isoard, Mont-Viso, etc., etc. 2000-2500 m. Fl. 6-7.

— *serpyllifolia Scop.* Pelouses : Galibier, cols Isoard et des Ayes, etc. 2000-2500 m. Fl. 6-7.

— *herbacea* L. Lieux humides : Lautaret autour du lac du Haut-Richard, Galibier, Buffère, Mont-Viso, etc. 2200-2500 m. Fl. 7.

Bétulacées.

Betula alba L. Côteaux, bois : Saint-Martin de Queyrières. 1100 m. Fl. 4-5.

— *pubescens Ehrh.* Côteaux, bois : Lautaret, 2000 m. Fl. 5.

Alnus viridis DC. Bois : Lautaret à Pra-Brunet, vallée du Guil, col de Ruines, etc. 2000 m. Fl. 6.

Abiétinées.

Pinus sitvestris L. Forêts : Briançon, Saint-Chaffrey, Val-des-Prés, etc., etc. 13-1600 m. Fl. 5.

— *uncinata Ram.* Forêts : Névache, vallée de Cervières, Saint-Véran, etc. 1500-2000 m. Fl. 6.

— *pumilio Hœnke.* Lieux tourbeux : Mont-Genèvre à Gondran. 2000 m. Fl. 5.

— *cembra* L. Forêts : Cervières à Piméan, les Ayes, Saint-Véran au bois la Selle, col de Vars, etc. 2000-2200 m. Fl. 6.

— *picea* L. Forêts : Briançon sous Prorel, les Ayes, etc. 1800-2000 m. Fl. 5.

Digitized by Google

Pinus abies L. Bois : Névache, Plampinet, etc. 15-1800 m. Fl. 5.

— *larix* L. Forêts : partout à l'exposition Nord-Est. 1400-2000 m. Fl. 6.

Cupressinées.

Juniperus communis L. Côteaux, bois : Monêtier, Briançon, Val-des-Prés, Mont-Genèvre, vallée de Cervières, Queyras. etc. 1300-2200 m. Fl. 4-5.

— *alpina Clus.* Côteaux : Lautaret, Gondran aux Tempêtières, Queyras, col de Vars, etc. 2000-2200 m. Fl. 7.

— *sabina* L. Rochers : Plampinet au rocher du plan, vallée de Cervières, combe de Queyras, Château-Queyras, etc. 1200-1600 m. Fl. 5-6.

Colchicacées.

Bulbocodium vernum L. Prairies : Lautaret, Monêtier à Puy-Chevalier, Lavachette au Vallon, Val-des-Prés à Granon, Mont-Genèvre, les Ayes, vallon Agnel, Saint-Véran à la Grangeasse, etc. 1600-2200 m. Fl. 4-5.

Colchicum autumnale L. Prairies après la fauchaison · partout. 1300 m. 1900 m. Fl. 8-9.

— *alpinum* DC. Prairies : Lautaret, Granon, Plampinet, Mont-Genèvre, vallon des Ayes, Mont-Viso, col de Vars, etc. 1700-2200 m. Fl. 7-8.

Veratrum album L. Prairies : Lautaret, Mont-Genèvre, Saint-Véran, col de Vars, etc. 1900-2100 m. Fl. 7-8.

Tofieldia calyculata Wahl. Lieux tourbeux : Lautaret, Monêtier, Lavachette, Gondran, etc. 14-2000 m. Fl. 7-8.

— *borealis Wahl.* Lieux tourbeux : col Malrif, Mont-Viso aux sources du Guil. 2500 m. Fl. 7-8.

Liliacées.

Tulipa alpestris Jord. Prairies : Mont-Genèvre vers le moulin, vallon Agnel à Rochafras, Saint-Véran au bas des prés de la Selle. 1800-2200 m. Fl. 6.

Digitized by Google

Frilillaria Delphinensis GG. Prairies : Lautaret, Mont-Viso, vallon Agnel, Saint-Véran à la côte Grimaud, etc. 2000-2400 m. Fl. 6-7.

Lilium martagon L. Prairies ; bois : Lautaret, Mont-Genèvre, Cervières, Saint-Véran, col de Vars, etc. 1800-2000 m. 7-8.

— *croceum, Chaix.* Rochers : montagnes du Bez près le Monêtier, Briançon vers les Sallettes, Vallouise, Mont-Viso. 1400-1800 m. Fl. 6.

Lloydia serotina Rchb. Pelouses, rochers : Arcines, Haut-Richard près le Lautaret; Grand-Charviat sur le Mont-Genèvre, Mont-Viso à la Taillante, etc. 2500 m. Fl. 6-7.

Ornithogalum monticolum Jord. Prairies : Monêtier aux prés Chabert. 1500 m. Fl. 5.

— *rigidulum Jord.* Champs : Saint-Véran. 2000 m. Fl. 5.

— *alpestris Jord.* Prairies : Saint-Véran. 2000 m. Fl. 5.

— *propinquum Jord.* Prairies : Saint-Véran. 2000 m. Fl. 5.

— *tenuifolium Guss.* Rocailles: Lautaret, Mont-Genèvre. 1800-2000 m, Fl. 6.

Gagea fistulosa Duby. Prairies, bois : Arcines, Lautaret, Monêtier, Echauda, Mont-Genèvre, Mont-Viso, St-Véran, etc. 1600-2000 m. Fl. 5-6.

— *arvensis Schultz.* Champs : Briançon, Monêtier, Lavachette, etc. 13-1500 m. Fl. 4-5.

Muscari racemosum DC. Champs : Monêtier, Briançon, Lavachette, Val-des-Prés, vallée de Cervières, etc. 13-1500 m. Fl. 4-5.

— *botryoides* DC Prairies : Mont-Genèvre. 1800 m. Fl. 5-6.

Allium schœnoprasum L. Lieux tourbeux : Lautaret, Gondran, Saint-Véran à Clausis, col de Vars, etc. 2000-2200 m. Fl. 5-6.

— *foliosum Clarion.* Bords des ruisseaux : Lautaret, Péas, Mont-Viso, col de Vars, etc. 2000-2200 m. Fl. 7-8.

Digitized by Google

Allium victorialis L. Prairies : Lautaret à Pra-Brunet et à la Madeleine. 1800-2000 m. Fl. 7-8.

— *carinatum* L. Prairies : Villar-d'Arène, vallon de Vars. 1800-2000 m. Fl. 7-8.

— *strictum Schrad.* Pelouses : Lautaret à la Varsilla, Mont-Viso, Fontgillarde. 1900-2200 m. Fl. 7-8.

— *flavum* L. Rochers : à l'entrée de la Combe du Queyras vers Guillestre. 1100 m. Fl. 7-8.

— *fallax Don.* Rochers : Saint-Véran à Clausisset. 2300 m. Fl. 8.

Paradisia liliastrum Bert. Prairies : Lautaret, Montgenèvre, col des Ayes, Mont-Viso, Saint-Véran, etc. 1900-2100 m. Fl. 6.

Asphodelus subalpinus GG. Prairies, côteaux : Lautaret, Saint-Véran à la côte Grimaud. 2000-2300. Fl. 6.

Smilacées.

Paris quadrifolia L. Bois frais : Monêtier, Névache, etc. 14-1700 m. Fl. 5.

Iridées.

Crocus vernus All. Prairies : Briançonnais et Queyras à la fonte des neiges. 1400-2000 m. Fl. 4-5.

Amaryllidées.

Narcissus poeticus L. Prairies : partout. 1200-2200 m. Fl. 5-6.

Orchidées.

Cephalanthera rubra Rich. Bois : Lavachette. 1400 m. Fl. 6-7.

Epipactis atro rubens Hoffm. Bois : Lavachette, Mont-Genèvre, etc. 14-1600 m. Fl. 6-7.

— *palustris Crantz.* Lieux marécageux : Lavachette, Val-des-Prés, etc. 14-1500 m. Fl. 7-8.

Listera ovata R. Br. Bois : Monêtier, Briançon, etc. 13-1600 m. Fl. 6.

Digitized by Google

Orchis globosa L. Prairies : Lautaret, Névache, Gondran, col de Vars, etc. 1800-2200 m. Fl. 7.

— *sambucina* L. Prairies : Lautaret, col de Vars, etc, 2000 m. Fl. 6.

— *incarnata Willd.* Prairies : Lautaret, col de Vars, etc. 2000 m. Fl. 6.

— *incarnata Lin.* Prairies : Lautaret, Monêtier, cols de Vars, etc. 1600-2000 m. Fl, 6.

— *viridis Crantz.* Prairies, bois : Lautaret, Buffère, Cervières, Saint-Véran à côte Grimaud, etc. 2000-2300 m. Fl. 7.

— *albida Scop.* Bois : Névache aux Rochilles, Granon. Cervières au bois de ville et à Piméan. 1900-2200 m. Fl. 6-7.

Herminium monorchis R. Br. Lieux tourbeux : entre Lavachette et Val-des-prés, plaine des Alberts, Chamandrin et Saint-Blaise. 1200-1400 m. Fl. 6.

Nigritella augustifolia Rich. Prairies : à peu près partout. 1900-2200 m. Fl. 7.

Ophrys alpina L. Lieux tourbeux : Malrif, vallon Agnel, Saint-Véran au haut pont près Clausis. 2200 m. Fl. 8.

Potamées.

Potamogeton marinus L. Lacs, étangs : Villar-d'Arène, col des Ayes sur Brunissard. 2000 m. Fl. 7-8.

Typhacées.

Sparganium minimum Fries. Etangs : col des Thures près Névache. 2000 m. Fl. 7-8.

Joncées.

Juncus arcticus Willd. Lieux tourbeux : Lautaret, col de l'Echauda, col Agnel, Saint-Véran vers Roche-ronde et à Clausis. 2000-2300 m. Fl. 8.

— *filiformis* L. Lieux humides : Lautaret, Névache à Laval et aux Rochilles. 20-2300 m. Fr. 8.

Digitized by Google

Juncus Jacquini L. Lieux humides : col Péas, vallon des Ayes, Mont-Viso, vallon Agnel, Saint-Véran à Clausis. 2200 m. Fl. 7.

— *triglumis* L. Lieux humides : Lautaret, Gondran, col des Ayes, Mont-Viso, Saint-Véran à Clausis, col de Vars, etc. 2000-2300 m. Fl. 7.

— *trifidus* L. Rochers : Lautaret, Névache à Buffère et à Laval, Mont-Viso, etc. 2000-2200 m. Fl. 7.

— *alpinus Vill.* Côteaux : Lautaret vers Côte plane, Saint-Véran à Clausis, etc. 2100-2300 m. Fl. 7.

Luzula flavescens Gaud. Côteaux : Cervières à Venton. 2300 m. Fl. 7.

— *maxima DC.* Bois : Cervières au bois de ville, Saint-Véran, etc 1900-2100 m. Fl. 7.

— *spadicea DC.* Rochers : Lautaret, Névache aux Rochilles, col des Ayes, Mont-Viso, Saint-Véran, etc. 2000-2300 m. Fl. 7.

— *nivea DC.* Bois frais : Lavachette dans la Molle et les Bancs, Cervières au bois de ville et à Piméan, etc. 1500-2000 m. Fl. 7.

— *lutea DC.* Pelouses : Arcines, Gondran, Mont-Viso, col Agnel, etc. 2200-2500 m. Fl. 6-7.

— *spicata DC.* Prairies : Lautaret, Névache à Buffère et à Laval, montagne de Prorel, Mont-Viso, etc. 1500-2000 m. Fl. 6-7.

— *pediformis Vill.* Prairies : Lautaret à Pra-Brunet, Monêtier, Mont-Genèvre aux prés Rignon et à Gondran, etc. 1800-2200 m. Fl. 6-7.

Cypéracées.

Schœnus ferrugineus L. Lieux humides : Lautaret à Pra-Brunet. 1900 m. Fl. 7.

Eriophorum alpinum L. Lieux tourbeux : col de Vars près du refuge. 2000 m. Fr. 8.

— *Scheuchzeri Hoppe*. Lieux tourbeux : Galibier, Mont-Viso, col de Vars, etc. 1700-2200 m. Fr. 7-8.

Digitized by Google

Scirpus compressus Pers. Lieux humides : Lautaret, Mont-Genèvre, Queyras, etc. 2000 m. Fr. 7-8.

— *pauciflorus Ligth.* Lieux humides : Lautaret, Galibier, Guillestre. vallée du Guil, etc. 12-2500 m. Fr. 7-8.

— *cæspitosus* L. Lieux humides : Lautaret, Echauda, Gondran, Queyras, etc. 2000 m. Fr. 7-8.

— *alpinus Schl.* Lieux humides : Villar-d'Arène, Malrif sources du Guil, etc. 2000-2500 m. 7-8.

Elyna spicata Schrad. Rochers : Lautaret, Galibier, Mont Viso, col Vieux, etc. 2000-2500 m. Fr. 7-8.

Carex rupestris All. Rochers : Galibier, col Isoard et des Ayes, Mont-Viso, etc. 2300-2500 m. Fr. 8.

— *fœtida Vill.* Pelouses : Arcines, Lautaret, Galibier, les Ayes, Mont-Viso, Saint-Véran, etc. 2000-2500 m. Fl. 7-8.

— *curvula All.* Rochers : Lautaret, Galibier, Névache aux Muandes, Mont-Viso, col Vieux, Saint-Véran, etc. 2000-2500 m. Fr. 7-8.

— *bicolor All.* Lieux tourbeux : Galibier, Echauda, les Ayes, Mont-Viso. 2300 m. Fr. 7-8.

— *alba Scop.* Bois de pins : Briançon, Lavachette, de Val-des-prés à Plampinet, etc. 14-1500 m. Fr. 6.

— *capillaris* L. Lieux tourbeux : Lautaret, Echauda, col des Ayes, Queyras, etc. 1400-2000 m. Fr. 8.

— *ustulata Wahl.* Lieux marécageux : Bords du Guil au pied du Mont-Viso, la Taillante. 2300-2500 m. Fr. 8.

— *atrata* L. Pâturages : Arcines, Lautaret en face du refuge, Galibier, les Rochilles sur Névache, Mont-Viso, etc. 2000-2500 m. Fr. 8.

— *nigra All.* Pelouses : Arcines. Lautaret, Galibier, la Madeleine, Mont-Viso, col Agnel, etc. 18-2500 m. Fr. 6-7.

— *gynobasis All.* Rochers : Lavachette, les Bauches, Malefosse, etc. 14-1700 m. Fr. 6.

— *frigida All.* Pelouses : Lautaret à Casse-Girarde, Galibier, Malrif, Péas en Queyras, col de Vars, etc. 2000-2500 m. Fr. 7.

Digitized by Google

Carex hispidula Gaud. Pelouses : Lautaret, Galibier, aux Mendettes. 2000-2200 m. Fr. 7.

— *ferruginea Scop.* Pelouses : Buffère et Laval sur Névache, Lautaret, etc. 2000-2300 m. Fr. 7.

— *firma Host.* Lieux humides: Lautaret, Monêtier, Mont-Viso à la Taillante, etc. 1700-2500 m. Fr. 7-8.

— *tenuis Host.* Bois : Briançon, Cervières au bois de ville et à Piméan, etc. 1490-2200 m. Fr. 7-8.

Graminées.

Phleum alpinum Scop. Pelouses : Galibier, Cervières à Venton, etc. 2300-2500 m. Fl. 6-7.

— *Michelii All.* Prairies : Lautaret à Pra-Brunet, Buffère, col des Ayes sur Brunissard. 19-2300 m. Fl. 7-8.

Alopecurus Gerardi All. Pelouses : Arcines, Lautaret, Galibier, Rochilles, Gondran, Mont-Viso, Cervières à Venton, Saint-Véran à Clausis, col de Vars, etc. 2200-2500 m. Fl. 6-7.

Oreochloa Pedemontana B. et Reuter. Rochers : Mont-Viso au vallon des vaches et à la Traversette. 2300 m. Fl. 7.

Agrostis alpina Scop. Pâturages et rochers : Lautaret, Névache aux Rochilles et au Vallon, Mont-Viso, vallon Agnel, etc. 2000-2500 m. Fl. 6-7.

— *rupestris All.* Rochers : Névache à Laval, Lautaret, Galibier, Gondran, col Isoard, vallon Agnel, etc. 2000-2300 m. Fl. 7-8.

Stipa capillata L. Côteaux : Briançon, sous le fort des Trois-têtes, Queyras. 1400 m. Fr. 5-6.

— *pennata* L. Rochers : Lautaret, Névache, vallée de Cervières, Briançon, Saint-Véran, etc. 1300-2200 m. Fr. 4-5.

Lasiagrostis Calamagrostis Link. Côteaux : Val-des-prés, Montgenèvre, Briançon, etc: 13-1800 m. Fl. 6-7.

Deschampsia cœspitosa P. B. Prairies : Lautaret, Névache, aux Rochilles, etc. 2000 Fl. 6-7.

Avena sempervirens Vill. Pâturages : Lautaret. 2000 m. Fl. 6.

Digitized by Google

Avena montana L. Prairies : Lautaret, Galibier, Echauda, Mont-Viso, etc. 2000-2300 m. Fl. 7-8.

— *Hostii Boiss.* Prairies : Mont-Viso vers les Chalets de Ruines. 2300 m. Fl. 8.

Trisetum versicolor Vill. Prairies : Lautaret, Mont-Viso, cols Vieux et Agnel, etc. 2000-2300 m. Fl. 7-8.

— *subspicatum F.B.* Rochers : Villar-d'Arène sous les glaciers du Bec, Echauda, cols Malrif et Agnel. 2000-2300 m. Fl. 7-8.

— *distichophyllum P. B.* Côteaux, graviers : Lautaret, la Madeleine, Névache au Vallon et aux Thures, rampes de l'Infernet, cols Isoard et des Ayes, etc. 15-2200 m. Fl. 7-8.

Kœleria alpicola Gr. God. Bords des routes : Lautaret, Lauzet. 1700-2000 m. Fl. 7.

— *Valesiaca Gaud.* Côteaux : Briançon. 1300 m. Fl. 6.

— *Cenisia Reuter.* Côteaux peu gazonnés : Gondran sur Cervières; les Ayes sur Brunissard. 2200 m. Fl. 8.

Glyceria distans Wahlb B. (*Aira Brigantiaca Chaix*). Endroits où a séjourné de la chaux : autour du fort des Trois-têtes, de Briançon à Lavachette. 13-1400 m. Fl. 6-7.

Poa supina Schrad. Côteaux : Lautaret, Mont-Viso, etc. 2000 m. Fl. 6-7.

— *minor Gaud.* Pelouses : La Grâve, Malrif, Cervières à Venton, les Oules, Mont-Viso, etc. 2000-2500 m. Fl. 7-8.

— *laxa Hœnk.* Rochers : Rochilles. Malrif, Venton, col des Ayes, Mont-Viso, etc. 2300-2500 m. Fl. 7-8.

— *cœsia Smith.* Rocailles : Lautaret, Névache au Vallon, Mont-Viso, etc. 2000-2300 m. Fl. 7-8.

— *alpina* L. Pelouses : la Ponsonnière, les Thures de Névache, col Isoard, Queyras, etc. 2000-2300 m. Fl. 6-7.

— *distichophylla Gaud.* Côteaux : Lautaret, Galibier, combe des Thures sur Névache, etc. 2000-2500 m. Fl. 7-8.

Digitized by Google

Melica Nebrodensis Parl. Rochers : Névache, Briançon, etc. 13-1700 m. Fl. 6 7.

— *nutans* L. Bois : de Névache à Créteau, Mont-Genèvre, etc. 17-1900 m, Fl. 6.

Festuca Hallerl All. Rochers : Lautaret, col Isoard, Mont-Viso, etc. 2000-2300 m. Fl. 7-8.

— *violacea Gaud.* Pelouses : Lautaret, Rochilles, cols d'Isoard et des Ayes, Mont-Viso, Saint-Véran, etc 2000-2300 m. Fl. 7-8.

— *pumila Chaix.* Pelouses : Lautaret, Galibier, cols d'Isoard et des Ayes, Mont-Viso, col Agnel, etc. 2000-2500 m. Fl. 7-8.

— *varia Hœnke.* Rochers : Lautaret, Mont-Viso, etc. 2000-2300 m. Fl. 7-8.

— *flavescens Bell.* Pelouses, rochers : La Grâve, Val-des-prés à Dormillouze, Abriès, Ville Vieille et Molines en Queyras. 2000 m. Fl. 7.

— *spadicea* L. Prairies sèches : Névache à Laval, les Thures, Gondran, Mont-Viso, vallon Agnel et de Vars, etc. 19-2200 m. Fl. 7-8.

Agropyrum repens P. B. Champs : Briançon, Monêtier, etc. 13-1600 m. Fl. 6-7.

Nardus stricta L. Pelouses : sur toutes les montagnes. 2000-2200 m. Fl. 6.

Fougères.

Botrychium lunaria L. Prairies : Lautaret, Granon sur Val-des-prés, Cervières au col Bousson, col des Ayes, vallon Agnel, etc. 2000-2300 m. Fl. 6-7.

Polypodium dryopteris L. Débris de rochers : Monêtier, Briançon, etc. 13-1500 m. Fr. 7-8.

Woodsia hyperborea R. Br. Rochers : La Grave, vallon de l'Alp sur Villar-d'Arène. 15-2000 m. Fr. 7-8.

Aspidium lonchitis Sw. Bois : Lautaret, Monêtier, Mont-Viso, etc. 1600-2000 m. Fr. 7-8.

Polypodium felix-mas Lois. Bois : Monêtier, Mont-Genèvre. 1600-1900 m. Fr. 6-9.

Digitized by Google

Asplenium Halleri DC. Rochers : La Grave, Lavachette, etc. 14-1600 m. Fr. 7-8.

— *viride DC.* Rochers : Echauda, Névache dans le vallon et la combe des Thures. 2000 m. Fr. 8-9.

— *septentrionale Hoff.* Rochers : Monêtier, Buffère, etc. 1500-2000 m. Fr. 7-8.

Allosurus crispus Bern. Rocailles : Arcines près de la Romanche, la Grâve, Lautaret à Casse-Rousse, etc. 1600-2000 m. Fr. 7-8.

Lycopodiacées.

Lycopodium selago L. Rochers : Lautaret, Névache au vallon de l'Eau, Mont-Viso, etc. 2000-2500 m. Fl. 7.

Selaginella spinulosa R. Br. Lieux humides : Lautaret, Monêtier à Peyra-Jouana, Laval près de Névache, Queyras, col de Vars, etc. 1900-2200 m. Fl. 6-7.

Briançon, le 21 Janvier 1885.

LANNES,

Capitaine des Douanes en retraite.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google